


- G O U G O U J I B I N G -




最经典的狗狗疾病知识手册：

一本在手，狗狗疾病再不愁！



@狗狗知识大全 编著

狗狗疾病 一本足够



前言:

大家好, 其实, 我写“一本足够”系列是很阴差阳错的事情: 我自己很喜欢狗狗, 但是我刚养狗的时候, 很少能找到特别有用的狗狗图书; 而网上的东西又很只鳞片爪, 缺乏系统。所以我一直想: 要是有一本简单而实用的狗狗书就好了。

在今年夏天的一个晚上, 一时手痒, 就随手开始写了自己第 1 本狗狗书--《金毛犬一本足够》。但是没想到这本书完成后, 竟然得到大家这么多鼓励!

于是, 我再接再厉。在秋天结束时, 终于完成了第 2 本《狗狗训练一本足够》。这本书上市后不到一星期, 在淘宝上居然成了“宠物类电子书销售第一名”! 这里, 真的要谢谢你们们的厚爱!

衷心希望这最新出炉的第 3 本书--《**狗狗疾病一本足够**》, 能够继续帮助各位爸爸妈妈, 更好的护理好我们的小天使, 让它们永远健康快乐!



我写《一本足够》系列的原则是以下 3 点:

1) 有用。一本书尽量把所有的重要知识的讲清楚。让狗主只通过一本书就能掌握养狗的核心知识。我尽量让书里全是“干货”, 不浪费大家时间。

2) 简洁。简洁就是减少各种无关的话与图片。“狗狗知识大全”自己浏览了很多狗狗图书, 感觉很多宠物图书无用的地方太多了。比如: 大量的抒情, 几千字的赞美, 多半本的狗狗无关彩图..., 100 页的书, 也就 10 页有用。所以我自己写的书希望每一部分都尽量简洁, 不瞎扯, 不糊弄。

3) 易懂。“@狗狗知识大全”自己非常不喜欢一些宠物书---这些书写的太过专业与晦涩。而我想大部分朋友都不是太专业的养狗者, 过于专业的词汇或知识, 只能让大家望而生畏。

养狗本来就是一件很快乐的事, 不是吗?

(注: 本书只是作为狗狗疾病参考性读物, 仅供借鉴之用。如有问题, 请以宠物医院或医师的诊断为准, 特此声明。)

目录:

第一章：你的狗狗要生病了

- 1.1、留心狗狗的 6 点生病征兆
- 1.2、狗狗五官异常，都是得了什么病呢？
- 1.3、狗狗的体味很重要
- 1.4、目测检查狗狗应注意的 6 方面



第二章：狗狗常见疾病

- 2.1、狗狗呕吐是怎么回事？
- 2.2、感冒：狗狗常见病
- 2.3、便秘：狗狗拉不出粑粑是怎么回事？
- 2.4、肥胖症：狗狗怎么变胖了？
- 2.5、咳嗽：狗狗咳嗽吃什么药？
- 2.6、拉肚子（腹泻）
- 2.7、驱虫：怎么给狗狗驱虫？为什么要驱虫？
- 2.8、犬瘟：狗狗最可怕的敌人
- 2.9、狗狗得了细小怎么办？
- 2.10、厌食症：我的狗狗不吃东西了
- 2.11、眼屎多
- 2.12、消化不良
- 2.13、体臭：香狗狗怎么变臭了？
- 2.14、掉毛（脱毛）
- 2.15、流鼻涕
- 2.16、发烧
- 2.17、狗为什么会“蹭屁股”？
- 2.18、抽搐
- 2.19、肠胃炎
- 2.20、耳朵发炎
- 2.21、鼻炎
- 2.22、皮肤病：狗狗身上的“牛皮癣”
- 2.23、角膜炎
- 2.24、老龄犬的通病：白内障
- 2.25、佝偻病

第三章、突发情况的应急治疗

- 3.1、如何预防狗狗中暑？
- 3.2、狗狗外出晕车怎么办？
- 3.3、溺水
- 3.4、骨折
- 3.5、出血不止

- 3.6、烫伤（烧伤）
- 3.7、车祸
- 3.8、扭伤

第四章：让你变成狗狗小医生

- 4.1、带狗狗去医院应该注意什么？
- 4.2、狗狗的内外科看病要点
- 4.3、疫苗知识大全：接种时间、要点与常见问题
- 4.4、怎么给狗狗滴眼药？
- 4.5、狗狗真假感冒识别
- 4.6、各种病症的看护知识
- 4.7、怎么喂狗吃药？
- 4.8、脱毛的护理
- 4.9、降低狗狗皮屑多的方法
- 4.10、小狗狗为什么易得“细小”和“犬瘟”？
- 4.11、狗狗四季疾病防御——春季篇
- 4.12、狗狗四季疾病防御——夏季篇
- 4.13、狗狗四季疾病防御——秋季篇
- 4.14、狗狗四季疾病防御——冬季篇



第五章：常见犬种保健小知识

- 5.1、西施犬
- 5.2、博美犬
- 5.3、金毛
- 5.4、吉娃娃
- 5.5、拉布拉多犬
- 5.6、哈士奇
- 5.7、比熊犬
- 5.8、萨摩耶

第六章：疾病大全列表

- 6.1、传染性肝炎
- 6.2、狂犬病
- 6.3、伪狂犬病
- 6.4、结核病
- 6.5、犬窝咳
- 6.6、犬瘟热
- 6.7、犬细小病毒病
- 6.8、蛔虫病
- 6.9、钩虫病

- 6.10、犬恶丝虫
- 6.11、食管丝虫病
- 6.12、旋毛虫病
- 6.13、绦虫病
- 6.14、球虫病
- 6.15、犬利什曼原虫
- 6.16、疥螨病
- 6.17、蠕形螨病
- 6.18、虱
- 6.19、硬蜱
- 6.20、犬疥螨的治疗
- 6.21、犬膀胱炎
- 6.22、犬睾丸炎
- 6.23、卵巢囊肿
- 6.24、犬子宫内膜炎
- 6.25、犬子宫蓄脓
- 6.26、流 产
- 6.27、产后搐搦症
- 6.28、不育症
- 6.29、犬胃肠溃疡
- 6.30、犬胃扩张
- 6.31、口炎
- 6.32、扁桃腺炎
- 6.33、胃扭转
- 6.34、肛门腺
- 6.35、肝硬化
- 6.36、肠炎



第一章

你的狗狗要生病了！



主人，你没注意到
我要生病的信号吗？

第一章：你的狗狗要生病了

你的狗狗每天都应该是快乐而活泼的。比如在你下班后，狗狗会和你淘淘气，撒撒娇，甚至家里垃圾筐被乱翻一气。尽管你会非常头疼狗狗缺乏训练，而抱怨不已。但是当您有一天当你下班，突然发现狗狗不淘气了，趴在床边一动不动.....

这时你才发现，其实狗狗能够每天淘气，是一件多么让人高兴的事情呀。

如果您想避免以上情况的出现，就要留意狗狗的一些生病征兆。

1.1、留心狗狗的 6 点生病征兆

警报 1：狗狗突然不活泼了：健康的狗狗应该精神饱满，两只耳朵应该时时转动，非常灵活。而不健康的狗狗则会精神不振，身体软弱无力，动作迟钝，耳朵也不摇动；

警报 2：鼻部干燥流鼻水。健康的狗狗应该鼻镜湿润，并附有少许汗珠。而一旦鼻子干裂（严重还会有龟裂纹理），同时鼻腔有清水样或者黏稠的鼻液，您的狗狗就一定是要生病了。

警报 3：排便不正常。健康的小狗，每日排便两次左右，大便颜色因食物而异，通常为黑色或黄褐色，而且应该软硬适中。而狗狗如果突然有下痢、便秘现象，粪便有时稀得像水或者坚硬如石块，也都是疾病的症状。

警报 4：体温升高。成犬为 37.5-38.5℃，而幼犬体温稍高，一般幼犬的体温约为 38.5-39.5℃。一般说来，狗狗早晨的体温低，中午至傍晚的体温高，约差 0.5-1℃。一般测量狗狗体温时，把体温表插入狗狗肛门 3 分钟后即可。如果体温高于 39.5℃就要引起警觉。

（注：有的网上资料说超过 39℃ 就是发烧。“@狗狗知识大全”提醒大家：这个是不全对的，一定要区分是幼犬还是成犬。）

警报 5：食欲不振或食欲迅速降低。如果小狗吃了脏东西或不能消化的异物，胃部功能会反常，出现不肯吃饭或呕吐现象。

警报 6：眼睛有异物分泌。狗狗生病后，眼睛会变得怕光、有眼屎，甚至结膜充血。



一旦你的狗狗出现以上 6 种情况，这就是狗狗已经给你发出“我病了”的信号了。亲爱的朋友们，这时候您就一定要注意了！


1.2、狗狗五官异常，都是得了什么病呢？

我们在上一节，了解了小狗狗生病的一些基本症状。下面，“@狗狗知识大全”再为大家详细的介绍一下：狗狗五官异常对应，都有可能是什病：

一、眼睛异常：


各位狗主应该每隔一段时间，用手扒开狗狗的下眼皮检查结膜。正常情况下：狗狗结膜颜色应是粉中略带红色。而出现以下几种其它颜色，就是疾病导致：

- 红色。发炎、充血时结膜为红色；
- 黄色。肝病、丝虫病引起黄疸病，结膜呈现黄色；
- 白色。贫血的话，结膜是白色；
- 青紫色。呼吸道、心脏病引起的青斑症时，结膜成青紫色。



二、鼻子异常：

在健康状况下，除了睡觉和刚睡醒时，狗的鼻子应是湿润的，表面有一层透明的液体。而如果狗突然出现没有精神、没有食欲、鼻涕像脓一样，不停地打喷嚏等症状时，有可能是患了鼻腔疾病或是传染病。



鼻子异常症状主要有四点，分别是：

- 鼻尖干燥；
- 鼻中流出像脓一样的鼻涕；
- 出鼻血；
- 连续打喷嚏；

三、口腔异常：

健康的狗，口中无异味，除了夏季特别炎热的情况下，口水也不会很多。而以下这几点，都是不正常的：

- 口中有异味；口臭的原因，可能是牙结石、牙周疾病引起的。
- 口水增多，并夹带血丝、吃东西时表现出痛苦的表情。可能是口腔炎、肿瘤或是牙周疾病。

四、耳朵异常：

健康狗的耳朵和嘴一样，没有异味。如果有耳垢，请用棉棒或纱布清除干净。

在狗的耳疾当中，最普遍的是外耳炎疾病。如果耳内只是有一些黑色的分泌物和脏东西的话，用专门的点耳药就能治好，但如果出现耳朵发烧、溃烂、伴有恶臭，并不停地摇头等症状时，就可能是严重的外耳炎、内耳炎或中耳炎了。



特别是耳部下垂、耳内多毛的品种要特别小心这类疾病。

耳朵异常症状分别是：

- 狗的耳内污浊；
- 狗来回摆头（可能是由于耳朵痒）；
- 狗的耳朵内有异味；
- 翻开耳朵，狗耳朵发热、变红；

1.3、狗狗的体味很重要

有时候，当您抱起的狗宝宝，会发现你的狗狗变臭了。其实这时候，您不用先急着给狗狗洗澡，正确的做法是：先看看是狗狗身体哪部分来的臭味----有可能不是狗狗脏了，而是狗狗因为病了才变臭的。

一些有经验的养狗人士，一般每隔两星期便会为狗狗做气味检查，以便第一时间知道狗狗健康状况的变化。身为主人的您，宜多加留意您家狗狗的体味，因为体味可以反映狗狗健康状况的变化：

一、口中臭味

口臭是令狗狗有体臭的头号杀手。当狗狗进食过后，因为食物残渣仍留在齿缝之间，令口腔发出臭味。但是这样的臭味不会非常持久，因为唾液能够很快地将食物残渣冲走。至于持续性的口臭，则往往是由牙周病（牙肉）所引起的。

牙周病的成因，是由于牙菌膜和牙垢在齿缝间积聚而成。细菌在温暖又湿润的口腔内生存和大量繁殖，同时它们会释放含有硫磺成份的物质，这就是臭味的来源。

研究发现，狗狗口臭会导致狗狗其他身体器官的毛病，以及刺激肿瘤的生长。口臭能导致牙齿齿髓内的组织死亡，令牙根松脱和牙齿脱落。情况严重的话，只有替狗狗牙齿做根管治疗和使用抗

生素才能解决问题。

二、皮肤发出的臭味

如果狗狗的皮肤有伤口，发出异味是很普遍的。因为伤口会因为受细菌感染而扩大，从而使皮肤发出臭味。另外荷尔蒙问题、内分泌失调，都会使狗狗的皮肤产生异味。

此外，寄生在狗狗皮肤上的跳蚤，也会让狗狗会因为瘙痒而去抓皮肤，这样会导致皮肤严重的病菌感染，也都是臭味的来源。

臭味往往还有一个来源：狗狗长时期用舌头舔着皮肤，唾液会将细菌和尘埃等积在皮毛中，也会引致臭味发出。



很多时候，狗狗变臭并不是因为不洗澡

三、体内胃气

还有一个体臭的来源就是胃气了。狗狗一般不会有强烈的胃气，如果有，往往是小肠阻塞，肠胃病这类疾病导致的。

另外，如果有时食物吃的太杂，狗狗消化不好，也会产生胃气。如果是这种情况，控制的方法非常简单，只要为狗狗提供容易消化、低纤维和含有适量蛋白质的食物，就可以了。

四、耳朵发出的臭味

最后一个臭气来源是：狗耳朵。狗耳朵发出异味，是因受到细菌或寄生物所感染。特别是一些长耳朵的狗狗，比如约克郡犬、北京犬等，更容易沾染污物。



狗主可每隔两星期，给狗狗清洁耳朵一次

狗主可每隔两星期，用沾上酒精的棉花棒，为狗狗清洁耳朵。遇到严重的情况，最好带狗狗到兽医诊所作详细的检查及适当的医治。

如果您通过耐心的检查，发现狗狗以上地方都没有问题。那您就别等了：快去给您的狗狗洗个澡吧！呵呵，它真是有点臭臭了~

1.4、目测检查狗狗应注意的 6 方面

通过以上的介绍，“@狗狗知识大全”相信大家对于狗狗的健康监测，有了一定的了解。下面我再

给大家介绍一下比较专业的“狗狗目测检查的6个要点”：

一、精神状态

健康的狗狗，都精神抖擞，行动灵活，双目有神，两耳常随声音而转动，即使是睡觉时，也始终保持警觉状态，听到一点细微的动静，就竖耳侧听，双眼盯视有动静的方向，表示出非常机灵的精神状态。



而一旦狗狗要生病，出现双目无神或半闭，不愿活动，喜静卧不动，两耳对外来刺激反应迟钝或无反应，甚至呈昏睡状态，这些都属神经抑制状态，称为精神沉郁或昏迷。

另外，还有的病犬表现兴奋不安，室内室外到处乱跑，惊恐，高声尖叫，常无目的地走动，转圈，甚至乱咬各种物品等，这样的精神状态称为精神兴奋或狂躁。上述两种精神状态，都属不正常的精神表现。

二、营养状况

怎么衡量狗狗的营养状况好坏呢？主要观察看狗狗的身材和被毛。

健康的狗狗身材应该都非常健美，肌肉非常结实，毛发光顺而富有光泽，使人看后有一种舒适感。套用一句东北话，应该的“刚刚的”！

而你的狗狗如果身体消瘦，肌肉松弛无力，被毛粗糙无光、焦干，尾根毛逆立等，不用说了，八成是患有寄生虫病、皮肤病、慢性消化道疾病了。

三、姿态

健康的狗狗，无论站卧都是非常精神漂亮的。

而一旦狗狗在站立或行走时，四肢软弱无力（表明四肢有异常），或者犬躺卧时身躯蜷缩，头置于腹下或卧姿不自然，不时翻动（表明腹痛）。都是病态。



四、体温

在正常生活条件下，健康犬的体温保持在一定范围内：通常清晨最低，午后稍高，一昼夜间的温差一般不超过1℃。如果超过1℃或上午体温高、下午低，都表明体温不正常。

健康犬的正常体温是。幼年犬 38.5-39.5℃，成年犬 37.5-38.5℃。

判定犬发热的简单方法，是从犬的鼻、耳根及精神状态来分析。正常犬的鼻端发凉而湿润，耳根部皮温与其他部位相同。如果发现犬的鼻端（鼻镜）干而热，耳根部皮肤温度较其他部位高，犬的精神不振、食欲不良而渴欲增加时，则表明该犬体温高。

这里“@狗狗知识大全”也顺便给大家介绍一下正确的体温测量方法：

给狗狗量体温最准确的方法是：肛门法。

1、把体温计插入狗狗肛门。测温前，狗主应先将体温计的水银柱甩到 35℃ 以下，然后用酒精棉球擦拭消毒，并涂清水（或者润滑剂）。


2、然后狗主左臂将狗抱住，左手提起狗狗尾巴，右手把体温计缓缓插入狗狗肛门内 3-4 厘米。一般 3 分钟左右即可取出，然后读取度数。当犬兴奋、紧张和运动后，直肠温度可轻度升高。

3、如狗狗体积很大，可以双人配合测量：一人搂抱狗狗，另一个人测量。

量体温的方法

* 体温计的使用方法

技巧
使用电子体温计，不用担心体温计破裂。



技巧
应选择头部细长的体温计

技巧
体温计的头部用保鲜膜包好再使用，这样安全，卫生又方便使用

* 大型犬量体温的方法

技巧

为防止狗狗受到惊吓没，最好是找一个协助抱着狗狗的人可以不停地抚摸，并说一些安慰的话。

技巧
抬起狗狗的尾巴就能看见肛门。



五、呼吸系统的观察

呼吸检查主要统计狗狗的“呼吸数”。“呼吸数”一般根据胸腹部的起伏动作测定，即胸腹部的一起一伏为 1 次呼吸。寒冷季节也可根据呼出气流来测定。

不过，狗狗的“呼吸数”常受某些生理因素和外界条件影响：如幼犬比成年犬稍多，妊娠母犬比未妊娠母犬多，尤其在运动或兴奋时常可增加好多倍。此外，气温、季节的变化也可影响呼吸数的变化。

一般来说，健康犬的呼吸数为每分钟 15-30 次。

六、消化系统的观察

观察犬的消化系统功能是否正常，应注意以下几方面：

1.6.1、呕吐状况的观察

犬是容易发生呕吐的动物，在正常情况下，有时也可呕吐，因此，要注意区别和分析呕吐的原因。如一次呕吐多量的胃内容物，而短时间内不再出现呕吐，这往往是过食所引起。呕吐实际上是机

体的一种保护性反应。

因此，当发现犬呕吐时，应根据发生呕吐的时间、次数、呕吐物的数量、气味以及呕吐物的性质和成分，认真分析，加以区别。

如频繁多次性的呕吐，表示胃粘膜长期遭受某种刺激，故常于进食后立即发生，直至将胃内容物吐完为止。

1、呕吐物呈咖啡色或鲜红色，常是程度不同的胃肠炎或胃溃疡，以及出血。

2、呕吐物为带泡沫的无色液体，或者是顽固性的呕吐，则有可能是胃炎、十二指肠、胰腺的顽固性疾病（如癌肿）所引起。



3、呕吐物常是粘液，特别是如呕吐物中混有寄生虫，大多因肠道感染了线虫。

另外，有时候给狗狗强制喂食或灌药时，也易引起狗狗的呕吐，狗主们需注意。

1.6.2、排粪、排尿状况的观察

通过狗狗的排便动作，也能反映出狗狗的健康情况。比如你的狗狗拉粑粑时，表情是否痛苦？排泄物是否颜色正常？次数是否过分？这些都可以看出狗狗的健康与否。



1、犬的排粪姿势都是近乎坐下的下蹲姿势。如果不采取正常的排粪姿势，而粪便自肛门内不由自主地流出，可能是持续性腹泻、肠道传染病的后期以及肛门括约肌弛缓或麻痹导致。

2、如犬作频频的排便动作，但无粪便排出或只有少量粘液，这可能是直肠部梗阻的表现，因而病犬表现神态不安，有疼痛感，食欲减退或停食，腹部胀满并蓄有多量气体，须及时治疗。

3、如排粪费力，粪便干、硬、小，量少，色暗，表面带有粘稠的粘液或伪膜，见于便秘的初期、热性病或轻度胃肠炎等。

4、若粪便变稀软，数量增加，粪便内混有未消化的食物，说明该犬的消化功能下降。

5、若排粪次数增多，不断排出水样、粥样或混有粘液、脓液、血液、气泡等，这些都是肠管受刺

激后，肠管运动增强的结果，常见于肠炎等病。

6、如狗狗的粪便外附有鲜红色血液时，是后部肠管出血的特征；而血液均匀地混于粪便中并呈黑褐色时，说明出血部位在胃及前段肠管。

第二章

狗狗常见疾病



这一章，可都是我最容易得上的疾病哟~

第二章：狗狗常见疾病

在本章中，“@狗狗知识大全”将为大家介绍近 30 种狗狗常见的疾病，包括：犬瘟、细小病毒、感冒、眼屎多、肥胖、呕吐、拉肚子、体臭、肠胃发炎.....等疾病的相关知识和治疗方法。

通过对这些疾病的介绍，“@狗狗知识大全”希望能帮助大家更好预防和照顾好自己的宝宝。



2.1、狗狗呕吐是怎么回事？


呕吐是养狗中最常见到的一种现象，很多朋友一看到自己的狗狗呕吐就害怕。其实很多时候，呕吐是狗狗的一种保护性反应，可将一些无法消化或者有害物质排出体外，有一定的保护作用。

引起呕吐的原因很多，表现形式也各不相同。最常见的原因就是急性感染，如：细菌性胃肠炎、细小病毒性肠炎、食物中毒等。其次是咽和食道、胃肠异常。

一、要注意狗狗呕吐物的颜色：

一般来说，狗狗是耐饿不耐饱的，所以只要吃超量时，它就会产生呕吐的行为！呕吐的时候，大家一定要观察呕吐物的颜色及形态，这样才能更清楚的知道狗狗到底怎么了。

1、如果狗狗吐出来的是食物，而且又马上把食物吃回去，之后就没事了。这样的呕吐是属于生理性的呕吐，也就是类似反刍的呕吐，这样的呕吐是不必看医生的。



2、如果吐出来的是唾液，大多数是食道的问题。如：食道异物（食物卡在食道内，通常是骨头居多数）


3、如果呕吐物的颜色是透明或是白白稀稀的，这就是胃液，也就是胃分泌的胃酸，这类的呕吐以急性胃炎的情况为最常见。

（但是如果吐完以后就正常的，可以先不看医生，只要禁食 12 小时就可以了。如果呕吐持续，那还是要看医生，因为也有可能是胃肠道阻塞异物、或者肝脏、肾脏、胰脏所引起的呕吐！）

4、如果呕吐物的颜色是黄黄绿绿的，那代表的是胆汁被吐出来了，通常看到这种颜色的呕吐是要看医生的！因为这代表的状况就很多了，除了上述的肝肾胰等问题以外，还有胃肠道的溃疡问题！

5、吐出来的呕吐物颜色为咖啡色，不是饲料或是食物的颜色，而是胃液的颜色是咖啡色的时候，这就代表着胃部有出血。最常见的是胃溃疡及十二指肠溃疡！

6、如果是鲜红色，那么别再犹豫了，这是急性出血，快快送医吧！



二、从呕吐频率分析

通过狗狗呕吐频率，也可以初步判断呕吐原因。

1、吃食之后，一次呕吐大量正常的胃内容物，而短时间内不再出现。这种情况，说明犬过食。

2、吃食之后，或吃食 2-3 小时后，发生呕吐、干呕。这种情况，常为急性胃扩张。

3、吃食之后，频繁多次呕吐，直到内容物吐完为止。这种情况，多为胃、十二指肠、胰腺疾病。

三、应对措施

当发生呕吐时，首先应注意观察犬呕吐的频度、次数、呕吐物的颜色、数量。如果呕吐 1~2 次，再无其他任何异常表现，呕吐后又继续吃食的多为生理性呕吐，可不予理会，但这种情形比较少见。排除生理性呕吐之外，如发生呕吐，一般采取以下措施。

1、一般呕吐对进食不发生影响者，无须特殊处理。

2、频繁呕吐影响进食的，应禁食、禁饮水 4-6 小时，以防误入气管。呕吐停止后逐渐进食，或静脉补充营养和水分。

3、镇静、止吐，如口服维生素 B6、安定、胃复安、阿托品或人用药吗丁啉，或氯丙嗪口服、肌注，也可肌注爱茂尔止呕。

4、呕吐过频，持续时间较长，不吃食，或吃食后即发生呕吐，同时伴有其他异常表现，如精神不振、体温升高等，则应及时送医治疗。

狗狗经常呕吐，而且呕吐物并非食物，同时有异色。可以怀疑因胃炎、胃内异物、胃扭转、食物中毒、药物中毒或犬细小病毒病的初期而致。

整体看来，虽然狗狗常常在呕吐以后，就若无其事的样子。其实除了生理性的呕吐问题以外（反刍），“@狗狗知识大全”还是建议您最好带狗狗去医院看看。

2.2、感冒：狗狗常见病

狗狗感冒主要原因是受寒冷的作用。特别是一些狗主比较粗心，饲养管理不当时，更易发生。

例如：寒夜露宿、久卧凉地、大出汗后遭受雨淋、涉水渡河时受冷水的刺激，长期饲养在阴冷潮湿环境中，这些都很容易让你的狗狗得上感冒：



一、狗狗感冒症状

如果狗狗得上感冒，主要症状是：狗狗的精神沉郁，表情淡漠，耳尖鼻端发凉流泪，体温升高（狗主可以用手摸摸狗狗大腿内侧，应该感到比较烫手），同时狗狗还有咳嗽。

如果治疗不及时，狗狗还非常容易从感冒转变成肺炎。

二、感冒的防治药品

- 1、早期可以给狗狗吃一些儿童的抗感冒药，如小儿感冒冲剂、感冒颗粒都可以；但是要注意剂量都是儿童剂量，不要给狗狗吃成人的。
- 2、有咳嗽症状的狗狗，可以加服口服复方甘草片，3-4片/次，每天2次。
- 3、早期也可以口服阿司匹林 1-2片/次；或者肌内注射 30%安乃近，每天 1-2次，每次 2毫升也可。

注意事项：

1、如果狗狗不到三个月大，用量不要超过成人用量的四分之一；不到六个月大，不要超过成人三分之一；成年狗狗用量在成人的三分之一就行。

2、狗主在平时要加强狗狗日常的耐寒锻炼，以增强爱犬对于感冒的抵抗力。

2.3、便秘：狗狗拉不出粑粑是怎么回事？

有没有发现，你的小狗最近拉屎特别的费劲？摆了半天姿势，蹲了半天，还叫个不停，可就是拉不出来。好不容易才来出来，但是粑粑还非常的干燥。如果是这样的话，你的狗狗应该是得了便秘了：

一、导致便秘的原因:

1、不良饮食习惯。比如进食不多或者食物过于精细; 饮水不足; 有异嗜癖; 平时爱吃沙、土等杂物; 排便不规律。不良饮食习惯是造成狗狗便秘最常见, 也是最主要的原因。

2、营养不良。慢性消耗性疾病, 造成肠弛缓, 使肠内容物后运无力, 滞存于肠道中;

3、药物因素。长期服用一些药品, 如阿托品、碳酸钙、硫酸钡等药物导致;



狗狗便秘会很长时间都拉不出来

二、狗狗便秘怎么治疗

狗狗一般 2 天以上不排便, 可说明存在便秘。此时应对犬的便秘采取有效的处理方法, 如不及时解除, 就会引起食欲不振、腹痛、肠鸣、反胃、恶心、消化障碍, 以致引起自身中毒, 从而出现全身性变化。

1、养成定时排便的习惯。犬如果能养成良好的排便习惯, 很多时候, 便秘是能够解除的。因为进食能促进胃肠反射, 所以排便时间最好安排在餐后, 带犬散步, 逐渐养成排便条件反射。



2、改善饮食。这是治疗和预防各种便秘的基础方法, 包括多喝水, 改善犬的口粮配方, 增加纤维素含量。多给予蔬菜和用玉米、高粱、白薯等粗粮做的饭菜, 可以防治便秘。平时可给予菜汤喝。

3、药物治疗。慢性便秘或老年犬的便秘可让犬喝含有蜂蜜的温水, 也可酌情使用番泻叶, 它具有缓泻的作用。(对于便秘比较严重的患犬, 可口服果导片 1~3 片, 也可给犬少量的食用油帮助犬泻下, 但不可长期使用; 或用开塞露从肛门内挤入。以上措施都能取得不错的效果。如果是急性便秘, 可灌服硫酸镁 10~20 克加入自来水 200 毫升, 但时间不要超过 1 周。)

4、及时治疗结肠、肛门等原发性疾病。如果患肛周脓肿、肛门炎症, 就会惧怕排便, 推迟排便时间, 推迟时间越长, 大便越坚硬, 形成恶性循环, 所以应该及时治疗原发病。

5、人工辅助。可用食指(戴手套)插入肛门内, 将干粪团分割成小块, 抠出。

通过非手术治疗, 多数患犬可以得到治愈。如果经过上述治疗后, 狗狗的便秘症状仍然不能缓解, 应请医生实施手术治疗。

2.4、肥胖症：狗狗怎么变胖了？

说起“肥胖”这个话题，其实现在不光人有这个问题，狗狗的肥胖比例也越来越高。那么，都是什么原因引起狗狗肥胖呢？

一、导致狗狗肥胖的 4 个原因：

1、营养过剩

由于在宠物食品的竞争中，大家都把狗粮的适口性放在了第一位。所以这些狗粮不光包装精美，味道香甜，再加上一部分狗主溺爱狗狗，让犬自由进食。



中新网：英国一只超胖的拉布拉多犬体重高达80公斤
为了带它去兽医院检查，4个人合力才把它抬起。

结果造成犬的采食量过多，这是家庭宠物犬肥胖的最主要原因。

2、运动不足



可卡犬是一种容易发胖的犬种

无论是城市还是在城郊，人们工作都比较忙，犬主人没有时间带犬运动，使犬的运动量不足，肥胖症状加重。

3、遗传因素

狗狗的肥胖与品种、年龄、性别有关。一般来说，10年以上的犬易肥胖，母犬比公犬易肥胖，宠物犬品种中的巴哥犬、拉布拉多犬、比格犬、可卡犬、德国牧羊犬和约克夏犬等都是容易肥胖的品种。

4. 绝育手术

因为狗狗绝育后激素分泌减少，运动量也容易减少，但是进食量往往不变。所以狗狗在绝育之后，也很容易肥胖。

二、狗狗肥胖的治疗

一般来说，狗的体重超过正常值的 15%就是肥胖。狗狗肥胖目前无特效药，只有采取综合性的措施，方能达到减肥与保健的双重目的。

1、减食疗法。减少给食量和喂养次数，可以每天饲喂平时量的 60%-70%，分为 3-4 次喂给，平时不再喂零食；多喂一些低脂肪高纤维的全价减肥处方食品，以每周减少体重的 1%-2%为好。当犬的体重达到标准体重后，供给必要的维持食量。

2、增加运动量，加速热量消耗，减少脂肪合成每天固定时间带犬散步，提高热量消耗，才能达到减肥的效果。对小型犬来说，在身体状况稳定下，每天早晚应该各有1次20分钟的慢走散步；对德国牧羊犬和其他易肥胖犬种而言，每天应该维持2次30-40分钟的带犬跑步，这样可加快热量消耗并且增加体力。

三、给狗狗减肥的要点：

1、支持和耐心：让狗狗恢复适当的体重，是绝不能心急的。狗狗在减肥期间，最需要摸的支持和鼓励。

所以，你得多花一些时间和精力，留意狗狗的进度。只要持之以恒，定能成功。

2、运动：如果你的狗狗活泼健康，而且饮食正常，只不过是轻度超重，你只要带它多做运动就可以了。



狗狗肥胖，会导致关节炎、心脏病

初时带狗狗在家居附近四处走动，做做游戏；渐渐再增加运动量，例如跑步。当狗狗累得跑不动了，就表示它的运动量已经达到极限，你便让它休息一下再走，不要太勉强它。为了体重不反弹，运动的习惯一定要坚持下去。

3、奖励：如果你平时习惯以糖果或高热量的食物，去奖励狗狗做某些动作，那你便应改变一下，以其他的方式代替，如替它梳毛，拍拍抱抱，给它新玩具，甚至增加玩耍时间，都是可行的办法。

最后，“@狗狗知识大全”要提醒狗主一点：如果您坚持了一段时间效果不佳，可以先带狗狗前往宠物医院，做个全面身体检查。因为这就可能是疾病导致，如糖尿病、胰腺炎等。如果狗狗有病，则应先医治后再减肥。

2.5、狗狗咳嗽吃什么药？

有时候狗狗昨晚还好好的，但是到了第二天突然开始咳嗽，声音很吓人，这个是怎么回事呢？


很多狗主一听到狗狗咳嗽，心里就紧张，觉得狗狗有病了。其实不然，狗狗除了睡醒或兴奋时会产生咳嗽外，其它的原因还有很多。比如狗从温暖的室内突然到寒冷的室外，受冷空气刺激；还有受到烟雾或灰尘刺激。但是如果您的狗狗咳嗽了半天，那八成就是真的是有病了。

狗狗咳嗽的应对措施：

1、一般情况下，对轻度而不频繁的咳嗽，只要将痰液或异物排出，就可以自然缓解，无须应用镇咳药。

2、对无痰而剧烈的干咳，应用复方甘草片镇咳药，以缓解咳嗽，同时消炎处理。用药及剂量：复

方甘草片 1-2 片 / 次, 口服, 每天 3 次; 严迪、罗红霉素 100-150 毫克 / 千克体重, 口服, 每天 2 次; 利君沙 0.2-0.3 克 / 次, 每天 3-4 次, 口服。



3、对于有痰、痰较黏稠, 特别是脓性不易咳出的, 应使用祛痰药, 一般不宜止咳。用药及剂量: 氯化铵 0.2 毫克 / 千克体重, 口服, 每天 2 次; 碘化钾 0.2-1 克 / 次, 口服, 每天 3 次; 复方甘草合剂 5-10 毫升 / 次, 口服, 每天 3 次。

4、若咳嗽是由犬瘟热等传染病引起, 则要随时监测犬的体温, 观察有无其他症状, 必要时送医就诊。

总体来说: 当狗儿咳嗽的时候, 主人不必过度紧张, 要先分析其咳嗽的原因, 再对症治疗。

注意事项:

1、如果狗狗咳嗽, 应先停止训练和运动, 让患犬休息, 采取保暖措施, 保持室内空气流通和室内适当温度, 避免烟气刺激。


2.6、拉肚子 (腹泻)

狗狗“拉肚子”也可以叫做“腹泻”, “拉肚子”也是一种常见的狗狗疾病征兆。因为导致狗狗拉稀的原因有很多种, 所以一般我们先要找出狗狗的腹泻原因, 然后对症下药, 才有好的治疗效果:

一、消化不良

这是最常见的拉稀的原因, 尤其常见于半岁以下的小狗。

小狗的肠胃很娇嫩, 因为消化系统很娇嫩, 而且还缺少好多消化酶, 小狗消化不好就会拉稀, 要是不管它就会越拉越稀, 造成脱水, 那会是很危险的。在确信没有染上什么病的前提下, 狗主要停喂罐头和肉等不好消化的食物。



治疗方案:

一次喂两片乳酶生，一天 2-3 次就可以了，这样有一天的时间就会见效了。另外，这种情况下还可以试试“妈咪爱”（多维乳菌散，药店可以买到，是给婴儿吃的。），一次用一小管，粉末状拌在狗粮里或者溶解后直接喂下，一日 2 次，效果和用乳酶生是一样的。

需要的话控制饮食，可以先饿 1 天左右，并且以后每顿也不要喂的过饱，让狗狗肠胃先调理好。对待这种情况的拉稀不要紧张，重在调节。


二、肠炎

如果狗狗得了肠炎，也会拉稀。除了拉稀，狗狗的精神状态也不大好，体温升高。可以按下面的方法治疗，否则请尽快去医院检查确诊。

治疗方案：

治疗上可以口服庆大霉素针剂。药店常见的是 8 万单位两毫升装的，每次喝 2 万单位，每天两次。需要注意的是，在服用庆大半个小时后，需要给狗狗喂些活菌类的助消化药，如乳酶生、妈咪爱等，帮助狗狗恢复消化的能力。

实在不行，也可以去医院输液，补充体力，尽快消除炎症。



三、寄生虫

狗狗还有一种可能也会导致拉肚子----那就是肚子里有了虫子。如果是寄生虫引起的拉稀，在粑粑里可能会看到血丝。如果看到这样的粑粑，最好化验确定。

“@狗狗知识大全”这里建议各位狗主，应该平时 3-6 个月驱虫一次，彻底杜绝这种现象的发生！

注意事项：

1、狗狗拉稀最重要的是要注意观察他的精神状态和食欲，如果和平时没什么区别给他调理一下肠胃就可以了

2、犬瘟也会导致狗狗拉肚子。如果狗主平时没有给狗狗打过疫苗，一定不要忽视犬瘟的可能。

2.7、怎么给狗狗驱虫？为什么要驱虫？

很多家长都知道要给狗狗驱虫，但是为什么要驱虫？驱的是什么虫？什么时候驱虫？等等很多问题都在烦恼着众多家长。下面“@狗狗知识大全”给大家做一下相关介绍：

一、为什么要给狗狗驱虫?



所谓驱虫,从字面上理解就是驱赶虫子的意思了。小狗自出生后,因吃奶、舔毛、舔地面、乱吃杂物等多数会感染上寄生虫,导致犬营养缺乏、消瘦、贫血、生长缓慢,严重时造成肠阻塞、肺炎、支气管炎等,甚至死亡。

因此,给狗狗驱虫就显得十分的重要了。

防治寄生虫病的最基本也是最简单、最有效的方法----就是在寄生虫性成熟前和犬生长迅速的关键时期,主动用药加以驱虫。

二、驱的什么虫?

有些寄生虫的名字家长并不陌生,但是有些不常见的也许家长就不太清楚了。

寄生虫分两种,一种是体内寄生虫,一种是体外寄生虫。这些寄生虫都是以吸取狗狗身体的养分为主,在夺取狗狗身体营养的同时引起疾病,还有可能传染一些致命的疾病。

1、体内寄生虫:蛔虫、钩虫、鞭虫、心丝虫、肺线虫、犬肺吸虫、绦虫、犬旋毛虫、肝吸虫、弓形虫、犬黑热、食道线虫、犬舌形虫、伊氏锥虫、球虫等。

2、体外寄生虫:疥螨、蠕形螨、耳痒螨、跳蚤、肺壁虱、虱、软蜱等。



蜱是寄生在狗体表的吸血性寄生虫

三、常用驱虫药物

1、伊维菌素。对体内多数线虫均产生良好的驱除效果,对体外寄生虫如皮蝇、鼻蝇各期的幼虫以及疥螨、虱等有良效,但对绦虫、吸虫无驱杀效果。用量为0.2毫克/千克体重皮下注射。

2、左旋咪唑。对多种胃肠道线虫和肺丝虫均有高效,但对多数寄生虫的幼虫作用稍弱。内服,日剂量10毫克/千克体重,连用2日。

3、丙硫苯咪唑。对绦虫、线虫和吸虫的成虫及幼虫均有作用,但对胎儿的致畸作用也较大。用量为5-25毫克/千克体重。

4、噻嘧啶。对消化道线虫的驱虫作用良好。还可用于胃肠道寄生虫的预防,用药时可减少各种寄

生虫感染。内服，一次量，5~10 毫克/千克体重。

5、敌百虫。对消化道线虫和部分吸虫有效。可口服或药浴，用量为 75 毫克/千克体重，连用三次达到良好效果。

四、驱虫时间



1、新买进犬。新买进的犬隔离 2 周左右，待确无传染性疾 病，驱虫 1 次，10 天后 再驱虫 1 次，然后才能合群。

2、初配母犬。初配母犬可在配种前 25 天 左右驱虫 1 次，配种前 15 天左右再驱 1 次。

3、怀孕母犬。一般情况下怀孕母犬不驱 虫。如果寄生虫虫害严重或必须驱虫时， 可选择在怀孕母犬分娩前 30 天左右驱虫 1 次，选择片剂和粉剂较好，而且用药量

是正常用药量的 2/3。

4、公犬。公犬的驱虫视其配种和 体况而定，原则上 1 年驱虫 2 次，即第 1 次驱虫 10 天后可再补 驱 1 次，每年驱虫 1-2 次即可。

5、幼犬。幼犬一般在生后 25 天左右第 1 次，50 个 日龄左右第 2 次，3 个月龄第 3 次驱虫，以后每隔半 年驱虫 1 次。

6、群犬的驱虫。群犬的驱虫 1 年 2 次，第 1 次可选 在早春（2-3 月）进行，10 天后可再驱 1 次。因为 2-3 月份是寄生虫较为活跃的一个时期，很多寄生虫 都会随着春季的到来而发生，容易给犬造成感染。第 2 次的时间可逸在秋季（8-9 月）驱虫，10 天后可再 驱 1 次。



最后，“狗狗知识大全”再提醒大家一点：在为爱犬 驱虫前，最好要先化验爱犬的粪便，以确定主要是哪种寄生虫的感染，然后再针对性的用药，这 样的既快又安全。

2.8、犬瘟：狗狗最可怕的敌人

说起对狗狗威胁最大的病，“@狗狗知识大全”想一定是狗瘟了。这种病不但死亡率极高，同时有 极强的传染性，一般一只狗狗得上，一窝狗也都会传染上。所以这节内容，大家一定要好好看看！

这可关系到你的狗狗未来的健康。

一、先了解犬瘟的基本知识

犬瘟俗称“狗瘟”，是由犬瘟热病毒引起犬的一种高度接触性、致死性传染病。这种病死亡率很高，一般成犬可达 50%以上，小犬感染后死亡率甚至可达 80%以上。本病有一定的周期性，常 3 年 1 次大流行。



1、犬瘟是由于犬瘟热病毒（CDV）引起的。犬瘟热病毒对外界环境的抵抗力较弱，对热和干燥很敏感，干燥和大多数消毒药物均可杀死病毒，对紫外线也很敏感。本病毒对人无感染性。

2、犬瘟热在冬春和秋冬寒冷季节多发，主要原因是犬瘟热病毒在低温环境下能够较长时间的存活，如在摄氏 2-4 度的条件下，犬瘟热病毒可存活

并保持感染力数周，冷冻干燥可保存数年。这也是犬瘟在冬春和秋冬寒冷季节多发的主要原因。


3、在犬聚集的地方，如宠物店、养犬场、流浪狗收容所等最易发生疾病的传播。

4、犬瘟热各种年龄均可感染，但 2 月龄内幼犬因接受母源抗体，多数不会感染发病；4-12 月的狗狗发病率最高，死亡率 50%以上；2 岁以上发病率逐渐降低。犬瘟热的症状轻重不一，多种多样。

二、犬瘟症状

1、总体表现。患犬食欲不振或干脆不吃，精神萎靡，体温的变化呈双相热型，即体温先升高到 39-41 度，持续 1~3 天，然后逐渐消退，接近常温，几天后再次发生体温升高，严重者可导致死亡。

2、呼吸系统型（肺炎型）。表现为鼻炎和结膜炎，眼和鼻有浆液性或黏液脓性分泌物。若引发眼神经炎时则可导致失明。病毒侵害肺脏引起间质性肺炎，继发细菌感染后可引起支气管肺炎。临床上表现为咳嗽，呼吸困难，听诊有捻发音。



3、胃肠型。表现为呕吐和腹泻。病犬出现重度腹泻，偶尔排出血便，出现里急后重。

4、神经型。犬瘟热病毒可侵害中枢神经系统的任何部位。临床上神经症状可能与其他系统症状同

时出现，也可随后出现，主要表现为全身抽搐、咀嚼肌群痉挛、转圈和行为异常等。中脑、小脑和前庭受侵害时，表现为共济失调及姿态异常。脊柱感染表现为姿态异常、脊髓反射异常、瘫痪等。

三、防治

1、发病初期使用大剂量犬瘟热高免血清、犬瘟热单克隆抗体和犬用丙种球蛋白。犬瘟热高免血清小犬每次 5-10 毫升，大犬每次 20-40 毫升，肌肉注射或静脉滴注，每天 1 次，连续 3-5 天；犬瘟热单克隆抗体 5-20 毫升，皮下注射，每天 1 次，连用 3 天；犬用丙种球蛋白小犬每次 2 毫升，大犬每次 4~6 毫升，每天 2 次，连续 3-5 天。



2、使用抗病毒药物。聚肌胞小犬 0.5-1 毫克，大犬 1-2 毫克，肌肉注射，每天 1 次，连续 3~5 天；也可用病毒唑，小犬 50 毫克，大犬 100 毫克，肌肉注射，每天 2 次，连用 3 天。

3、强心补液。肠炎症状明显和呕吐严重的病犬，可用林格氏液 30-50 毫克/千克体重，10%葡萄糖酸钙 2-5 毫升，维生素 B6 50-100 毫克，混合静脉滴注。

4、对症治疗。如有脓性鼻炎或严重鼻塞的病犬，可用麻黄素、地塞米松和卡那霉素滴鼻液混合滴鼻；对于干咳或者痉挛性咳嗽的病犬可用咳快好、氨茶碱、扑尔敏、甘草片等药物止咳化痰；



5、支持治疗。对病程较长、出现衰弱症状的患犬，可静脉补给 10u/o 葡萄糖 30~50 毫克/千克体重，同时加入维生素 C 500 毫克、三磷酸腺苷 5~20 毫克、细胞色素 C 5 N15 毫克、复方氨基酸 100-250 毫升，对缓解病情、改善全身状况有良好的作用。

犬瘟是一种非常烈性的病毒。就是有的狗狗经过及时治疗保住了性命，但是也可能出现犬瘟热后遗症，如肢体瘫痪等。

注意事项：

1、定期作疫苗注射是最主要的预防措施。可用犬瘟热疫苗在 50 日龄、80 日龄、110 日龄进行 3 次免疫后，每年加强免疫 1 次。也可使用犬三联苗、五联苗、六联苗和七联苗，均按说明书使用。

2、病犬要在安静适宜的环境下休息，经常用温水擦拭眼角和鼻腔分泌物。

2.9、狗狗得了细小怎么办？

狗狗细小病毒病又称犬传染性肠炎，犬病毒性肠炎。这是一种传播性非常强，同时致死率又较高的一种病毒（特别是幼犬）。这里“@狗狗知识大全”给大家详细介绍一下，希望能帮助到大家。

一、细小病毒基本知识

细小病毒一般分为两种，即肠炎型和心肌炎型。肠炎型较为多见，主要特征有4点：

- ①病初体温升高，可达40~41℃；
- ②先呕吐、后腹泻，粪便初呈黄色或灰黄色，而后转为番茄汁样，气味腥臭，特别难闻；
- ③在呕吐、腹泻之后，即呈现明显的脱水症状，衰弱、消瘦，精神沉郁，眼球凹陷，皮肤弹性降低；
- ④后期肛门松弛，便血，倒地昏迷，体温下降至37℃以下，最后可因电解质紊乱并发酸中毒而死亡。



二、细小病毒的治疗

目前对“犬细小病毒”治疗尚无特效的方法，西医上多数采用对症治疗和支持治疗。如果治疗及时、很大比例的“犬细小病毒”的患犬，可以康复。如果病犬在发病的头3-4天内仍能存活，一般都能很快康复。



但是，如果机体的免疫功能差，再加之治疗措施不力，患犬往往死于细菌性败血症和内毒素血症。年龄越小的犬死亡率越高。

“细小病毒”的具体治疗方案如下：

- 1、免疫治疗在胃肠炎症状轻微时，可用细小病毒单克隆抗体和犬细小病毒病高免血清治疗，效果明显。前者每次5-10毫升，后者每次5~10毫升，每天1次，连用3~5天。
- 2、止血可选用肾上腺素、安络血、止血敏、维生素K3、维生素K1。
- 3、止吐频繁或持续性呕吐时，皮下注射灭吐灵（每8小时0.5毫克/千克体重），或者在静脉输液中加灭吐灵（每24小时1~2毫克/千克体重）。

4、止泻对于严重的持续性腹泻可口服思密达、水杨酸铋等。

三、中医治疗方法

中医治疗宜清热解毒、凉血止痢，可用下列方剂试治。

1、白头翁汤。白头翁、秦皮各 20 克，黄连、黄柏各 10 克，浓缩至 100 毫升，候温灌服。里急后重者，加木香、槟榔；夹食滞者，加枳实、山楂。

2、四黄郁金散。黄连、黄芩、黄柏、大黄、栀子、郁金、白头翁、地榆、猪苓、泽泻、白芍各 30 克，诃子 20 克，水煎，分 2 次灌服。呕吐者，加半夏、生姜；里热炽盛者加金银花、连翘；热盛伤阴者加玄参、生地、石斛；痢脓血较重者重用地榆、白头翁；气血双亏者减黄芩、黄柏、栀子、大黄，加党参、黄芪、白术等。

3、加味葛根芩连汤。葛根 40 克，黄芩、白头翁各 20 克、山药、甘草各 10 克，地榆、黄连各 15 克。水煎服，每天 1 剂，分 3-4 次，每次 50-100 毫升。

幼犬药量酌减，便血重者加侧柏叶 15 克；津伤重者加生地、麦冬各 20 克；里急后重者加木香 10 克；呕吐剧烈者加竹茹 15 克治之。



四、护理

病犬至少应在停止呕吐和腹泻，并且没有血便的后 24 小时后才能喂食。在开始喂食前，主要通过输液来维持犬的营养需要。



喂食时，应选用无刺激性的易消化食物，少量多餐饲喂。也可参照兽医人员提供的食谱，或以煮熟的去骨鸡肉加米饭饲喂，直到犬的胃肠功能恢复。

五、预防

接种疫苗是预防本病最有效的方法。

用灭活苗按以下程序接种：幼犬于 7-8 周龄、10-11 周龄进行 2 次免疫；妊娠母犬产前 20 天免疫 1 次；成年犬每年接种 2 次疫苗。也可用犬五联苗进行免疫预防，具体注射时间按使用说明。

2.10、厌食症：我的狗狗不吃东西了


一位朋友给“@狗狗知识大全”来信说：“我家小狗上个月不知道什么原因，吐了好多食物之后，就好像没什么食欲了。肉放到嘴边它都不吃，这是怎么回事呢？”

一般这种情况，有可能狗狗得了厌食症。厌食是指狗狗缺乏食欲或者对于食物根本不感兴趣。厌食并不确指某一种特殊的疾病，而是许多疾病中最常见的临床表现，多伴有恶心和呕吐。

一、导致厌食的原因：

1、疾病导致。包括：①疼痛（可抑制食欲中枢和饥饿中枢）；②消化紊乱（如胃肠扩张）；③内分泌（内分泌紊乱）；④肿瘤（在许多犬肿瘤病例中，厌食是唯一的临床症状）。

2、生理性因素导致。包括：①食物不合口味；②运动过度，犬极度疲劳；③犬处于饱腹状态；④口渴或天热；⑤妊娠晚期；⑥晕车。



二、如何应对厌食症？

1、一般来说，改善饮食条件，增加食物的香味，诱导犬采食是多数犬主人常用的方法，但这种方法只对生理性因素引起的厌食有效。

2、要注意区分你的狗狗是否为假性厌食。假性厌食指的是犬不是没有采食的欲望，而是患犬缺乏摄取、咀嚼和吞咽的能力。

3、对于厌食的诊断要点是找到病因。如果狗狗不吃饭，应检查狗狗的头、口腔、喉等，一般可以找到假性厌食的病因。



当犬接触食物时可能试着去吃，但是常表现出疼痛或不舒适---如果是这样，狗主你应该查看一下狗狗的口腔，看有没有异物、牙病、口腔炎等。此过程中，狗主可以戴上专用狗狗手套，更加卫生安全。

如都无异常，建议送狗狗到医院做进一步检查。


2.11、眼屎多

当狗狗眼泪中混有多种物质时，狗狗的眼角就会逐渐发黏，这就是眼屎。眼屎中包含有灰尘、炎症产生的物质和细菌繁殖产生的物质等。

一、眼屎多的原因：

1、结膜炎或者角膜炎。患犬一般表现为畏光、流泪、结膜潮红、疼痛、眼睑闭合和有分泌物。

2、犬瘟热。狗狗如果得了犬瘟，体温就会升高，一般在39-41度，持续1-3天，然后逐渐消退，接近常温，此时病犬似有好转，可吃食。几天后再次发生体温升高，可持续一至数周，病情也逐渐恶化，食欲下降或废绝，眼、鼻黏膜潮红，排出浆液性并逐渐转变为脓性分泌物



犬瘟热病毒引起的病犬眼屎增多

3、眼睑内翻。眼分泌物增加，分泌物呈灰白色。当继发细菌感染时，眼屎为脓性。

4、干眼病。患犬缺乏泪液，眼睑痉挛，眼球附有黏稠的眼屎，眼睑闭合困难，角膜增厚、混浊，

5、流泪症。泪通过鼻泪管排出。鼻泪管异常会造成泪堆积。患犬内眼角下方可见茶色泪痕，并堆积有黏稠的分泌物。

二、眼屎多的应对措施

1、狗主日常管理中应注意观察犬的眼睛：着重检查结膜或角膜有无外伤、左右两只眼是否相同、眼周围的毛有无变化、犬是否怕光或眯缝眼、眼睑是否红肿等。

2、加强对犬眼睛的护理：尤其是哈巴犬、北京犬、西施犬、吉娃娃犬、贵妇犬等犬种，它们的眼球大而突出，泪腺分泌泪液较多，常从眼角流出多量泪液，污染被毛，影响美观，所以应定期护理，养成清除眼垢的好习惯。

3、除了以上措施之外，由疾病引起的犬的眼屎，还应针对原发病进行治疗。

4、狗主在给犬上眼药时，要采用正确的方法。有时由于犬不配合，操作起来很困难，注意点眼药的方法，不要伤及眼睛。



2.12、消化不良

狗狗有时候就像个孩子，遇到好吃的东西有时也会暴食暴饮，难免也会出现消化不良的问题。那么狗狗消化不良如何治疗呢？

一、消化不良的主要原因：

a、饲养管理不当，让犬饥饱不均，暴饮暴食；



b、食物品质不良，冬季食物太冷，夏季食物放置时间过长而酸败变质；

c、所用餐具不干净，久用不消毒等也是发病原因。

二、临床表现：

a、有便秘、腹泻等症状，患畜呕吐，初为食糜，后为泡沫样粘液和胃液，依病变的性质不同，呕吐物中混有血液、胆汁和粘膜碎片等。

b、稀便初为水和粪混合物，后为水样变，有时混有组织碎片及血液。

c、犬轻度腹痛、体曲伏卧在冷暗处、腹部紧张，有轻度黄白舌苔，机体迅速脱水，尿色偏黄，病程一般为 2 至 5 天左右。

三、消化不良的治疗方法：

如果狗狗得了消化不良，狗主可以采用以下方法给狗狗治疗：

狗主要先给狗狗停粮一天，24 小时后给以菜汤、稀饭等易消化的流质食物。然后可给予健胃助化药物治疗，如乳酸菌素，胃酶合剂、食母生等，若拉稀便或水样便且混有粘液、血液者，可口服庆大霉素等。

脱水严重的可输入糖盐水、生理盐水，复方氯化钠。采取以上治疗措施并加强护理，2 至 3 日即可痊愈。

四、如何预防消化不良

如何预防狗狗的消化不良呢？主要是采取正确的饲养管理方法，做到饲喂定时、定量。

1、一岁以内幼犬，可一日喂 3-4 次，成年犬 2-3 次。

2、食物应加工煮熟，品种要多样化，粗杂粮搭配，如可交叉喂给米饭、面条、玉米、地瓜、芹菜、胡萝卜、白菜、熟肉，骨头汤等，保证犬均衡摄入各种营养物质，满



足生长发育的需要。

3、火腿肠等加工过的熟肉制品不应经常饲喂。

4、可以适当给予水果，特别是对小狗尤为重要

5、食物要保持新鲜，防止冰冻，霉败，食具要每次用后清洗、消毒，不与其它犬混用。

2.13、香狗狗怎么变臭了？体臭

狗狗体臭，是一件很让狗主头疼的事情-----尤其是爱干净的女性狗主，可能对于狗狗体臭更是在意。别急，“@狗狗知识大全”这就和您分享一下关于狗狗体臭的知识，帮您早日“脱离苦海”，呵呵~

一、狗狗体臭来源

狗狗身上的气味是它们拥有的特征之一。一般来说，狗狗的口部、皮肤、耳朵、尾巴和分泌腺是体味的来源。而狗狗体臭往往是由于：1、皮肤病；2、耳垢与中（外）耳炎；3、体表伤口；4、肠胃疾病导致。

二、体臭应对措施

1、首先要确认臭味的发源地，是狗狗全身有异味还是身体某个部位有异味。确定臭味的发源地后，对该部位进行检查，初步明确病因。

2、先看是不是皮肤病导致。当狗狗身上发出臭味时，先要应检查狗狗皮肤有无异常和发痒症状。如果是，可采用针对皮肤病的治疗方案。（犬的皮肤病治疗起来比较麻烦，有的时候不容易根治）。

3、当犬有口臭时，常用 0.1%高锰酸钾或 2%硼酸溶液冲洗口腔，补充维生素 A、C 和 B 族维生素，给予流质、易消化的食物，同时给予抗生素。

4、对于耳道异味，往往是外耳炎或中耳炎，这个可以买一些狗狗耳朵的清洁消炎药水。如不严重可以自行医治：先要进行耳道清洗，然后用生理盐水加入适量的抗生素软膏（金霉素、红霉素等），用药棉蘸药液将耳道清理干净，然后用滴耳油滴耳，每日1~2次。



注意事项:

1、在管理上,犬主人要加强对犬的护理,要定期给犬洗澡,每天梳毛,及时清理耳垢,做好犬牙齿的保健和护理等。

2.13、腿瘸

有时候,狗主会发现自己的狗狗走路怎么一瘸一拐的?引起狗狗瘸腿的原因有很多,比较常见的
外伤、肌肉拉伤、关节脱臼与骨折,还有一些狗狗更严重,是因为风湿病和佝偻病导致。

一、狗狗为什么会腿瘸?



1、外伤。比如钉子或石子、玻璃碎片扎伤等。

2、肌肉拉伤。肌肉拉伤严重。

3、关节扭伤或脱臼。扭伤局部可出现疼痛、
肿胀,行走障碍,甚至不能活动。严重扭伤
可能引起骨折或关节脱位。

4、佝偻病。佝偻病主要是维生素D缺乏,钙、
磷代谢障碍引起骨组织发育不良的一种非炎
性疾病,主要表现是消化紊乱、异嗜、跛行

及骨骼变形。

5、关节风湿。患病关节及其周围组织水肿,关节外形粗大,有热痛感。病犬起卧困难,运动时跛行,但随运动量的增加和时间的延长,跛行症状可减轻或消失。

6、骨折。跌倒、跳跃、碰撞等导致骨折、扭伤等;骨骼较为精致的犬种,如吉娃娃犬、马耳他犬,都极易发生骨折。

7、蚊虫叮咬。蜱在趾间寄生犬被蜱叮咬后,在体表吸血,机械地损伤皮肤,造成寄生部位的痛痒,其毒素注入犬体内还会引起肌肉麻痹瘫痪等症状。

二、应对措施

1、一般来说,患犬的犬爪敢于踏地,但是不敢向上抬腿,患部可能位于前肢的腕上部或后肢的跗上部。

如果患犬敢于向上抬腿但是不敢踏地,患部可能位于前肢的腕下部或后肢的跗下部。犬主应



着重在这些部位进行检查。

2、对可疑患部进行重点检查，从爪、趾缝逐渐向上触摸和检查，注意犬爪和指球有无扎伤、出血、铁钉、石子、玻璃碎末，趾间有无异物、有无虫体寄生、皮肤有无出血、有无肿胀、肿胀的性质、软硬度、波动、可功性、形状、大小、局部音响等，注意患部温度有无升高，皮肤和皮下状态怎样、肌肉有无麻痹等。



3、发现患肢，确定患部，找出病因后，根据病因进行治疗，犬主人还需采取以下措施：停止训练和运动，使犬静养；给予可口、易于消化的食物，设法提高犬的食欲；加强护理，防止蚊虫叮咬患部，防止患部感染等。

4、如果是风湿以及佝偻病导致，就要按照风湿以及佝偻病对应的治疗方法，先治疗这些疾病。

其实狗狗腿瘸，除了运动中的扭伤与骨折（这些狗主应该都能看到，而且也好治疗），基本就是风湿和佝偻病导致。是这些病的连带反应，这些病治好了，狗狗的腿自然也就不瘸了。

2.14、掉毛（脱毛）

无论是长毛狗还是短毛狗，只要有毛就会有掉毛。看着自己的狗狗的毛发一片片的掉下，狗主一定心急如焚。那么我们应该做点什么工作来补救呢？

一般狗狗脱毛分两种情况：1、正常的生理性脱毛；
2、不正常的病理性脱毛。

一、生理性脱毛

1、周期性换毛。

又称季节性脱毛，指每年晚春、初冬两季犬大量脱毛，主要是由于光线和温度变化引起的。

如牧羊犬、西施犬、松狮犬、北京犬等，夏天所需的毛量不必太多，所以天气回暖时就脱掉部分旧毛，以调节体温；而临冬时就会脱掉粗毛，更换绒毛，以度寒冬。这是犬对季节变化的适应性脱毛，属正常现象。

2、经常性换毛。



西施犬是一种非常爱掉毛的狗狗

一年四季的轻微脱毛现象，是机体正常新陈代谢的结果。只要对犬注意经常梳理，除去脱落犬毛，保持犬体卫生即可。

二、病理性脱毛

病理性脱毛，就是由细菌或者疾病导致的狗狗脱毛，主要有以下5个原因。

- 寄生虫感染，如螨虫、虱寄生、钩虫病；
- 真菌感染，如犬的小孢子菌和发癣菌属引起的秃毛癣；
- 雌激素分泌紊乱；
- 糖尿病；
- 维生素缺乏。



三、脱毛的治疗

1、生理性脱毛比较简单，主要注意给犬提供充足的营养，经常梳理犬毛，除掉脱落的犬毛，防止被毛纠缠成结、黏附污垢，即可消除疾病隐患。

2、对于病理性脱毛，如因为体内寄生虫，口服左旋咪唑；对于体外寄生虫，可皮下注射伊维菌素，2~3次/5天，0.2毫克/千克

体重。

3、因真菌感染而引起的脱毛，可以内服灰黄霉素 25~50毫克/千克体重，每日2次，连续用药3~5周，同时患部剪毛后清洗，除去痂皮，再外涂克霉唑软膏或达克宁软膏等抗真菌药剂来治疗。


4、对于内分泌失调引起的脱毛，可采取相应的激素疗法，如内服丙酸睾丸酮或甲地孕酮等治疗，必要时可采取绝育手术，摘除卵巢。

5、B族维生素的缺乏引起的脱毛，通过补充复合维生素B制剂就可以治愈。

2.15、流鼻涕

狗狗开始流鼻涕了，有没有问题呀？呵呵，其实一般小狗流鼻涕很正常，大家不用过分担心，很快你的狗狗就会好了。

（但是如果它出现厌食，咳嗽、呕吐、便秘这些现象，就要特别注意了！）



下面“@狗狗知识大全”教大家一些狗狗“流鼻涕”的诊断要点：

最初检查时，可用白纸巾放在狗狗鼻孔处。然后观察鼻水量、鼻涕的状态和颜色，通过鼻水的种类初步判断疾病。

1、如鼻汁呈浆液性，无色透明、稀薄如水的鼻汁，为感冒或鼻炎；



2、鼻汁呈黏液性，较黏稠，呈蛋清状，灰白色，为急性上呼吸道感染和支气管炎；

3、鼻汁呈黏液脓性，除了含黏液外，还含有部分脓液，故带黄白色，且富有黏性，为犬的副鼻窦炎；

4、鼻汁呈脓性，质地更黏稠，呈面糊状、油膏状或凝结成团块状，提示为犬瘟热、肺炎、支气管炎等；

5、浆液性或血液中混有泡沫，提示为肺出血、肺水肿或肺充血；有的鼻汁中混有血液、血丝或凝血块，为肺充血、异物性肺炎或肺气肿。

如果检查只是感冒导致的流鼻涕，可以加强护理，多给狗狗喝点水，或者给狗狗吃点板蓝根和抗病毒口服液。一般连续服用三天，狗狗的小感冒就会好起来。注意药量要按照儿童标准服用。

2.16、发烧

发烧也是一种狗狗常见的疾病，下面这位朋友的来信就是一个典型的狗狗发烧案例：“我家狗狗已经发烧三天，体温 39.5-40.3 之间，反复发烧。鼻子无干裂，狗狗有些打蔫，但是吃东西还不错。请问我应该注意什么呢？”

首先，“@狗狗知识大全”要提醒狗主一点：因为很多疾病会伴有发热的症状，比如犬瘟、细小病毒。如果连续高烧不退，为了安全起见，狗主最好能先带狗狗去医院检查一下，如果不是犬瘟或者细小，那发烧本身的治疗就非常简单的。

发烧的治疗方法如下：

如果想快点退烧，可以先带狗狗去医院做个血常规检查。没有问题的话，直接做退烧皮下注射即可。柴胡+安痛定各一支，隔 6 小时重复一次，很



快狗狗就会退烧。

如果不是太厉害，狗主附近又没有宠物医院，也可以采用护理治疗：



1、首先让狗狗多喝水，以促进狗狗多排尿，降低体温。

2、可采用 75%酒精或温水擦拭四肢、胸、背及颈等处，也可以用冰水或者凉水浸湿毛巾冷敷。一般于颈旁、腹股沟、腋下等处，每隔 5 分钟更换 1 次。

3、另外要注意多注意饮食卫生。狗粮一定要清淡，不能给狗狗吃油腻的食物。什么骨头呀、零食呀，更是千万不要给狗狗吃了。

2.17、狗为什么会“蹭屁股”？

狗狗有时候会出现“蹭屁股”这个动作，往往是由于疾病所致。比如有时你会发现：狗狗坐在地上，用屁股蹭来蹭去，感觉非常不舒服。狗狗这个动作有可能是肛周炎、肛门囊肿、消化功能异常、寄生虫感染导致。

一、狗狗蹭屁股常见原因

1、肛周炎。狗狗的肛门周围，出现湿疹或皮炎。

2、肛门囊肿。犬的肛门附近有 2 个蓄积分泌物而会散发臭味的肛门囊（肛门腺），由于犬的肛门腺出口阻塞出现炎症。轻度阻塞时，犬会在地上磨屁股或是跷脚舔屁股；严重时因肛门腺肿痛，会使犬排便困难，甚至会造成更大的病痛。

3、腹泻。因持续腹泻，直肠黏膜外露，犬感到不舒服而蹭屁股。

4、寄生虫病犬体内有绦虫时，因奇痒也会蹭屁股。



二、如何应对？

1、定期驱虫

如果你的狗狗检查肛门腺没有异味，但是狗狗依然还是经常在地上“蹭屁股”。可以给狗狗吃一些驱虫的药片（比如拜耳肠虫清），很可能是由于狗狗体内有绦虫所致。一般只要驱虫后，症状

都会缓解。


2、清洁肛门腺



狗主平时要定期清洁狗狗的肛门腺。肛门周围最容易脏，尤其是长尾巴、被毛厚的犬种，便后最容易弄脏，要特别注意。

具体清洁肛门腺手法如下：

1、先将狗狗尾巴向上翻起，使肛门突出；随后将手指放在狗狗肛门边的四点八点处挤压。有的狗狗会喷出黄褐色的奇臭的东东，有的狗狗只有一点点东东，很臭哟！经常吃肉肉的狗狗更需要挤哟！！



2、如果腺体已经被阻塞了一段时间，分泌物会象牙膏一样挤出，而不是喷出，通常只用轻轻挤压它们便可流出来。

3、如果犬的肛门腺不好挤，就需要另一种方式，既将食指和拇指放到腺体下面稍靠后的部位，轻轻向上向外挤压即可。

2.18、抽搐

狗狗有时候会出现抽搐的情况。狗狗一旦抽搐会出现四肢僵硬、喘气，甚至还有四肢划水样。抽搐是一种非常不好的病态，除了因中暑导致的抽搐问题不大外，一般抽搐都是由于犬瘟、脑炎、癫痫发作。

一、导致抽搐病因

1、中暑。常见于犬在强烈阳光下活动，如牵遛、训练、玩耍；在密闭的室内、犬笼内或将犬放在轿车内时间过长，因温度过高、通风不良、缺乏饮水而中暑；体形肥胖、有心脏病、被毛浓厚、缺乏锻炼的犬，也容易中暑。

2、中毒。如鼠药中毒、农药中毒。

3、犬低血糖。此情况主要发生于幼犬和



母犬。3月龄前的幼犬多发生一过性低血糖症（暂时性低血糖），多因受凉、饥饿或胃肠机能紊乱而引起。幼犬表现为精神沉郁，步态不稳，颜面肌肉抽搐，全身阵发性痉挛，很快陷入昏迷状态。

母犬多因产仔数过多，以至营养需增加及分娩后大量泌乳而致病，表现为肌肉痉挛，步态强拘，全身强直性或间歇性痉挛，体温升高达41~42度，呼吸、心跳加快。

4、犬瘟热。这是犬的常见传染病。

5、产后痉挛。多发生于小型犬，以狮子犬发病最多，尤以第1产和第2产发病率高，而且窝产数在4只以上，泌乳量高的犬居多，兴奋型的小母犬发病率最高，约占发病总数的90%以上。产仔数在3只以下者较少发病。

6、脑炎、脑膜炎。由于感染或中毒性因素的侵袭，引起脑膜和脑实质的炎症，包括各种脑部感染和脑病。

二、抽搐如何应对？



发生狗狗抽搐最常见的原因是癫痫发作，犬呈现僵直与抽搐，发作前犬显得焦躁不安，主要表现为咬牙与咀嚼、口唇向后收缩、口腔有泡沫、衰竭与昏迷、大小便失禁、蹬腿。

发生这种情况时，犬主人要按如下方法处置。

- 将狗狗安置在一安全、舒适的地方，并保持阴凉与安静。
- 盖上毛毯，避免碰触到地、墙及其他硬物，一直到发作缓解，防止外伤。
- 当出现僵直时，在僵直的间隙期要及时清除口、鼻中的黏液，保持呼吸畅通。同时清除粪、尿。
- 给予饮水，但食物减量，让其在安静环境休息。
- 尽快送医就诊。

2.19、肠胃炎

狗狗肠胃炎，也就是我们说的肠炎以及胃炎的总称，平时各年龄和各品种的犬均可发生。如果您的狗狗得了肠胃炎，最明显的特征就是狗狗会呕吐，同时呕吐物中混有血迹。

一、肠胃炎的原因

- 狗狗吃了腐败或不易消化的食物
- 药物引起，往往是由于滥用抗生素而扰乱肠道的正常菌群。

- 胃肠屏障机能减弱。如过度疲劳或感冒等引发。
- 并发症。某些传染病（如犬瘟热、犬细小病毒、钩端螺旋体病等）及寄生虫病（如钩虫病、鞭虫病、球虫病等）常伴发胃肠炎。

二、肠胃炎的症状

1、胃炎。主要表现为精神沉郁、频繁呕吐。呕吐物常混有血液，饮欲亢进，大量饮水后又呕吐。严重呕吐的犬，可导致脱水。触诊腹壁紧张，有明显压痛反应。

2、肠炎。主要表现为剧烈腹泻。病初肠蠕动亢进，伴有严重腹泻。粪便混有黏液和血液。后期腹泻便恶臭，患犬肛门松弛，排便失禁。体温达 40-41 度或降到常温以下。病情恶化时，狗狗四肢厥冷，腹痛减轻，最后陷入昏睡、抽搐而死亡。



三、肠胃炎的防治

对单纯性胃肠炎的患犬，应加强饲养管理。病初要禁食，限制饮水，然后先给予少量的肉汁或菜汤等，再逐渐增加食量。

1、病初期，为了排除胃内容物，可皮下注射盐酸阿朴吗啡 5-10 毫克，也可将硫酸铜 0.1-0.5 毫克稀释成 11% 的溶液灌肠等。持续腹泻的犬，可口服鞣酸蛋白 0.5-1.0 克或次硝酸铋 0.2-0.6 克，每日 2-3 次。



2、脱水明显的犬，用乳酸林格氏液静脉滴注，或林格氏液与 5% 葡萄糖液混合滴注。同时补加碳酸氢钠、维生素 C、维生素 B 和维生素 K。

3、中毒性胃肠炎应以解毒为主；传染性胃肠炎，采用抗血清和对症、维持疗法；寄生虫性胃肠炎，

以驱虫为主。辅之以对症和支持疗法。

2.20、耳朵发炎

耳炎在犬的发病率很高，包括外耳炎、中耳炎和内耳炎。

而且“@狗狗知识大全”告诉大家：耳炎是一种比较麻烦的病，治愈比较困难，大多数病例会反复

发作。

一、狗狗为什么会得耳炎?

狗狗为什么会得耳炎?最主要的原因是狗主护理不当: 1、外伤; 2、洗澡时水进入耳道; 3、犬进入不清洁和污染严重的水中游泳。以上三点都可以让狗狗感染细菌、使耳道发炎。



另外耳螨寄生后,也可诱发感染。

二、耳炎症状

多数病例是单侧耳发炎,但也有两耳同时发病的,主要是耳内进水引起,致使听力下降。

狗狗得了这个病后,患病一侧的耳下垂,狗狗容易剧烈摇头,或到墙壁、树干等处用力摩擦患部,用爪猛劲搔抓,患耳常被擦破和出血。耳道可因感染化脓后,排出黄色、水样、脓性和有臭味的物质。

如果继发了中耳炎、内耳炎,并随之发生蔓延性脑内感染时,犬向患侧转圈,常跌倒而不能站立,有时会出现眼球震颤和运动失调。如发生脑膜炎和小脑脓肿,犬多数会死亡。

三、耳炎防治

本病的治愈比较困难,大多数病例会反复发作。

1、应清洗耳道。先用生理盐水洗净耳内的脓汁、分泌物和耳垢,再用双氧水洗涤,擦净之后,注入抗菌素溶液。

2、为防止耳炎损害听神经,治疗的初始就应该进行全身性抗菌治疗。治疗用药时间至少10天,长者可达1~2月。必要时可对患中耳、内耳炎病犬实施外科手术,切开鼓室,放出渗出液,可缓解疼痛,使听力恢复。



2.21、鼻炎

很多狗主可能奇怪,狗狗还会得鼻炎??答案是:没错,狗狗也和人一样,也会得上鼻炎。而且您别小看鼻炎,慢性鼻炎常可成为狗狗窒息或脑病的原因,应予以重视。


一、狗狗得鼻炎的原因：

- 1、寒冷刺激，鼻腔粘膜在寒冷的刺激下，充血、渗出，于是鼻腔内的常在菌乘机发育繁殖引起粘膜发炎。
- 2、狗狗吸入刺激性气体，如：烟熏、尘埃、花粉、昆虫等直接刺激鼻腔粘膜，均可引起发炎。
- 3、某些传染病或邻近器官炎症的蔓延。

二、鼻炎诊断要点

1、急性鼻炎

病初鼻腔粘膜潮红、肿胀，频发喷嚏，病犬常摇头或用前爪搔抓鼻子，随之由一侧或两侧鼻孔流出鼻涕，初为透明的浆液性，后变为浆液粘液性或粘液脓性，干燥后于鼻孔周围形成干痂。



病情严重时，鼻粘膜明显肿胀，使鼻腔变狭窄，影响呼吸。常可听到鼻塞音。伴发结膜炎时，羞明流泪。伴发咽喉炎时，病犬呈现吞咽困难，咳嗽，下颌淋巴结肿大。

2、慢性鼻炎

病情发展缓慢，鼻涕时多时少，多为粘液脓性。炎症若波及鼻窦时，常可引起骨质坏死和组织崩解，因而鼻涕内可能混有血丝，

并有腐败臭味。

慢性鼻炎常可成为窒息或脑病的原因，应予以重视。

三、防治措施

对鼻炎的治疗。首先应除去病因，将病犬置于温暖的环境下，停止对犬的训练，适当休息。一般来说，急性轻症病犬，常不需用药即可痊愈。对重症鼻炎，可选用以下药物给病犬冲洗鼻腔：1%食盐水、2%~3%硼酸液、1%碳酸氢钠溶液、0.1%高锰酸钾液。

但冲洗鼻腔时，必须将病犬头低下，冲洗后，鼻内滴入消炎剂。为了促使血管收缩及降低敏感性，可用0.1%肾上腺素或水杨酸苯酯（萨罗）石蜡油（1:10）滴鼻，也可用滴鼻净滴鼻。

2.22、皮肤病：狗狗身上的“牛皮癣”

“@狗狗知识大全”在前不久在微博上做了一个调查，问大家“养狗时最头疼的事情是什么”？没想到，大概有十几个朋友说是狗狗的皮肤问题。

确实，皮肤病是一种非常让狗主们讨厌的疾病：尽管皮肤病一般不致命，但是它不好治，爱复发，而且最关键的是：本来是一只非常漂亮的狗狗，但是得上皮肤病之后，狗狗身上一块一块红肿的皮肤斑秃，难看死了。



皮肤病刚刚痊愈的狗狗

因为大家都非常关心这一疾病，“@狗狗知识大全”就多用一些篇幅，来详细介绍“皮肤病”--这一非常讨厌的狗狗身上的“牛皮癣”。

一、狗狗皮肤病概述：

犬的皮肤病在狗狗疾病中占很大比例。由于此类疾病病因复杂、病程长、易复发，给防治带来了一定的困难。从概念上说，凡是能引起皮肤瘙痒、脱毛、结痂、皮肤增厚等症状的疾病都是皮肤病。

从治疗上说，皮肤病的治愈率较低，尽管不能在短时间内引起患犬死亡，但是由于患处瘙痒，狗狗会不断抓挠、啃咬、摩擦，不但影响了犬休息，而且患处感染化脓，造成抵抗力降低，易继发细菌和病毒感染。尤其是有些人犬共患皮肤病，容易传染给人类，所以犬主人对犬的皮肤病必须给予高度重视。

二、狗狗皮肤病的原因



狗狗为什么会得皮肤病呢？一般来说，犬的皮肤病由于以下 5 大原因导致：

1、细菌感染。犬皮肤上常在的一些细菌造成感染。

2、螨虫感染。主要有疥螨和蠕形螨，蠕形螨多发生 5-10 月龄幼犬，有的没有痒感，该病特点抓痒不明显，病变多发于面部和耳部严重时发展到全身。

3、真菌感染。狗狗的毛发，皮肤表皮，爪角质组织中肤出现脱毛斑，皮损有渗出液、鳞屑和结痂。多发于面、耳、四肢等处。病初红肿抓痒，继而被毛脱落渗出物结痂，感染细菌时产生脓疱，出现全身症状。

4、营养缺乏。犬的饮食往往单一，如长期食肉，缺乏各类维生素。

5、护理不当。护理不当也会诱发皮肤病，如过度清洁犬的被毛，特别是常用碱性清洗液给犬洗澡，容易破坏犬的油脂保护层，使皮肤易感染病原菌使皮肤失去光泽。

三、皮肤病的防治

我们通过肉眼，就很容易诊断自己的狗狗得上了皮肤病，但要确定具体病因则非常困难：对于螨虫、虱、蚤以及真菌等感染，往往需要刮取病料后，进行实验室检查才能确认。



1、真菌性皮肤病治疗：

一旦在狗狗的头、颈和四肢的皮肤上，发现圆形断毛的秃斑，同时上面覆以灰色鳞屑，严重时许多癣斑连成一片-----这就是真菌性皮肤病。

狗狗如果得了真菌性皮肤病，首先要加强营养，搞好管理。饲料中要含有足够的蛋白，并注意补充各种维生素、矿物质和微量元素，以增强机体抵抗力。注意梳刷被毛，保持清洁，经常检查被毛有无癣斑和鳞屑，预防擦伤，避免与病犬接触。

其次病犬要及时隔离，同时用外用药物治疗：先洗去皮屑和痂皮，清整脱落和断裂的被毛，然后涂抹克霉唑软膏、或复方水杨酸软膏、咪康唑软膏，也可应用其他有效的药品，如癣净等，每天1—2次，直至彻底痊愈为止。交替使用两种软膏往往更好。灰黄霉素 25-50 毫克/千克体重，分2-3次内服，连服3-5周。

在用全身疗法的同时，患部剪毛，涂制霉菌素或多聚醛制霉菌素钠软膏，可使患犬在2-4周内痊愈。

在治疗的同时，应特别注意犬舍器具的消毒，2%-3%氢氧化钠溶液、5%-10%漂白粉溶液、1%过氧乙酸、0.5%洗必泰溶液等，都有很好的杀灭真菌的效果。

2、皮脂溢皮肤病治疗：

皮脂腺分泌过盛（皮脂溢）多发生于背部、腿、会阴、颈和耳内侧，狗狗的患部常有浅黄色蜡质样聚集物，并伴有脱毛、轻度瘙痒等炎症变化，蠕形螨内分泌紊乱亦常伴皮脂溢，它是很难根治的一种皮肤病。

目前主要采取以缓解症状为目的的对症疗法，很难达到根治的目的。（特别是对于病因不明的病例，仅能缓解症状，不能根除原因）。建议治疗方法如下：

1、清洗皮肤和被毛以防止皮屑和瘙痒及其角质软化。每周用硫化硒制剂涂抹和清洗1次；或者用

硫化汞复方制剂清洗皮肤；或用硫磺皂洗狗狗身体。



得了皮肤病的短毛狗狗，神态抑郁

2、应用肾上腺皮质激素制剂。肌内或皮下注射强的松龙 0.1-0.5 毫克/千克体重（或地塞米松 0.125~0.5 毫克/千克体重）；喷洒肤轻松软膏、地塞米松或波尼松龙喷雾制剂。

3、如果患部有渗出或感染，需全身或局部抗菌治疗。较严重的皮脂溢，可以应用抗菌素——皮质激素协同治疗。

4、在食物中逐渐加大高级不饱和油和饱和脂肪酸（牛肉、猪肉和鸡肉）的

量。除此之外，应用维生素 A、维生素 D、维生素 B2 和维生素 B6 制剂。

总之，皮肤病的防治关键在于：1、护理好狗狗平时的卫生。应该每天都给狗狗进行梳理（特别是长毛犬）；2、使用专用的中性香波给狗狗洗澡，一般夏季 1-2 周洗澡 1 次，冬季 2-4 周洗澡 1 次即可。3、密切注视犬皮毛的变化，如有异常情况应及时进行诊疗。

2.23、角膜炎

角膜炎是角膜组织发生炎症的总称。以角膜浑浊、溃疡、穿孔及留有角膜斑为特征。角膜炎是狗狗一种较常见的眼部疾病，各种犬均可发生，特别是长毛小型犬更容易得。

一、角膜炎症状：

1、外伤性角膜炎。在狗狗的角膜表面可见外伤痕迹，损伤部粗糙不平，角膜上皮损伤。

2、表层性角膜炎。角膜上皮肿胀，角膜面粗糙不平，透明度减低，混浊部呈淡蓝色或灰白色。

3、深层性角膜炎。炎症侵害角膜深层，触诊时眼球疼痛，角膜混浊呈白色不透明。周边的毛细血管呈扫帚状，略带紫色。

4、化脓性角膜炎。触诊狗狗的眼球，疼痛剧烈，眼内排出脓样分泌物。重者可造成角膜穿孔和化脓性全眼球炎。



狗狗得了角膜炎，眼角分泌物增多

二、角膜炎治疗：

1、消除炎症。首先我们要先给狗狗消炎，具体方法是用 3%硼酸溶液（或灭菌生理盐水）冲洗患眼，除去狗狗眼角的分泌物。然后在狗狗的结膜囊处，滴入抗生素眼药水（或眼膏），防止虹膜粘连，可用 0.5%-1%硫酸阿托品滴眼，每日 2 次。

2、促进角膜混浊的吸收。为消退新生血管和控制角膜混浊，促进角膜混浊的吸收，可向患眼内吹入等份甘汞和糖粉，每日 1 次，或用 0.5%醋酸可的松液给狗狗点眼，也是可以的。

2.24、老龄犬的通病：白内障

狗狗到了老年之后，和人类的老人一样，非常容易得上白内障。特别是 8-12 岁的老龄犬，得上白内障疾病的比例非常高。

“@狗狗知识大全”希望各位狗主：当狗狗陪伴你十多年，即将进入暮年时，你一定要注意好老年狗狗的眼睛。如果狗狗得上白内障，一定要尽早治疗，让狗狗告别痛苦。



8岁犬，患右眼白内障3年

一、 白内障病因

1、先天性白内障

先天性白内障可分两种，一种是可遗传性的，一种则是不可遗传性的。不可遗传性的先天性白内障，是由于晶状体及其囊袋在母体内发育时异常，发育畸形，致出生后所表现的白内障，一般需要在犬眼睁开后才能观察得知。可遗传性的白内障则是由遗传基因决定。

2、外伤性白内障。因各种钝性或锐性物刺穿角膜，导致狗狗晶状体营养障碍引发的白内障。

3、老年性白内障。主要见于 8~12 岁的老龄犬，同时也是最常见的白内障之一，是因晶状体纤维退化性老化而引致的晶状体混浊，其发病机理尚未明确，可能与紫外线、全身疾病如糖尿病、高血压等多种因素有关。

4、并发性白内障。指由全身或眼局部的病变引起的白内障，如糖尿病引起的长时间血糖增高，导致机体代谢障碍，就经常会并发白内障。糖尿病并发白内障的概率高达 60%

而在宠物犬中，最常见的是老年性白内障、先天性白内障和外伤性白内障，其次是激素异常和中毒等原因引起的白内障。

二、 白内障症状

病初晶状体未混浊时视力正常。当晶状体失去透明性，瞳孔变为蓝白色或灰色，具有珍珠样光泽，

视力降低或消失。严重者晶状体皱缩变小，可发生自然脱位。病后期晶状体变硬，失去多余的水分，检眼镜检查看不到眼底。



对犬白内障进行诊断的主要依据是该病的临床症状：

当犬出现视力衰退的症状，如步履蹒跚，在陌生环境中行走时常碰撞到物体，看不见抛过来的球，出现斜视，易受惊，对周围声响异常敏感，对陌生人有攻击倾向，对危险视而不见等时。

出现以上症状，就可以怀疑狗狗患有白内障了。

三、白内障防治

1、一般药物治疗难以抑制白内障的发展或使混浊减轻。对晶状体周围部分透明的犬，通过散瞳可改善视力。

2、对白内障病犬常施行外科手术（白内障囊外摘除术）治疗。


3、白内障的术后护理非常重要，如果术后没有护理好，会对手术效果造成很多不良影响。一般术后 2~5 天就可见犬视力有明显的提升，但这个时间受很多因素（如术前眼球状况、犬的行为、习惯、平时的生活习性等）影响。

此阶段主人要对犬只多给予照顾，要防止其发生脱水、咳嗽、过度兴奋等症状；要经常给手术眼滴眼药水；给患犬带上颈圈，防止抓伤；定时复检等。

2.25、佝偻病

本病是狗狗较常见的一种疾病，特别是幼犬如果营养不良、平时阳光照射不足，更容易得上。

此病主要是维生素 D 缺乏、钙、磷代谢障碍引起骨组织发育不良的一种非炎性疾病。临床特征是消化紊乱、异嗜癖好、跛行及甚至严重导致骨骼变形、X 型腿，卧地不起以至于瘫痪。



一、佝偻病病因

1、幼犬缺乏日光照射。

2、食物中缺乏钙、磷矿物质，或钙、磷比例失调，特别是磷的缺乏。

3、长期的慢性消化道功能紊乱、如腹泻、寄生虫病等，影响肠粘膜的吸收功能。

二、佝偻病症状

早期狗狗的症状是食欲减少、消化不良、有异嗜癖、精神不活泼、出牙期延长，被毛无光泽。

随着病程发展出现发育停滞、消瘦、严重的跛行、骨骺肿大、负重的长骨变形、表现O形腿或X形腿，重者可有卧地不起，全身骨骼变形疼痛以至瘫痪。

患有佝偻病的犬很易发生骨折，往往在自行跳跃、玩耍或稍有外力作用时即可出现骨折。

三、佝偻病治疗

1、平时要多带狗狗外出，给狗狗照日光浴。

2、维生素口疗法。每天给狗狗补充维生素D，3万-5万单位/千克体重，隔3-5日注射一次。或口服维生素D片，5万单位/千克体重，1次/日、连服7日。

3、葡萄糖酸钙注射液0.1-0.2克/千克体重、静脉滴注，每天1次或隔日1次。

4、食物中要经常保持钙质补充，如骨粉、钙粉。



为了防止佝偻病，平时要多带小狗晒太阳

第三章

突发意外的应急治疗



当我在户外玩耍时，可
很容易出现突发情况~

第三章：突发情况的应急治疗

随着狗狗的户外活动增多，各种突发意外的几率也会增多。比如中暑、溺水、晕车、出血不止、车祸受伤、骨折……

当你遇到这样的情况时，您知道如何紧急治疗的你的狗狗吗？



3.1、如何预防狗狗中暑？

因为狗不会出汗，也不会因为热而停止活动；而狗的身体不能自我调节温度，狗也不会自己照顾自己及时补水，所以天气热的时候，狗狗非常容易中暑。

狗的汗腺全在舌头上，所以看到狗吐出舌头喘气说明狗很热，需要喝水降温或静下来停止活动。（短鼻子的狗比长鼻子狗更怕热，更不容易散热）。

狗正常的体温应该在 37.5°C — 39.5°C ，体温到达 40 度以上时内脏器官开始受损，体温到达 41°C 以上时就属于高度危险了。在高热的环境或者是高湿闷热气候下，最快 20 分钟就有可能使狗的身体系统衰竭而死亡。所以中暑，是夏季或其他闷热天气条件下对狗健康的最大威胁。

一、中暑症状：

狗狗张着嘴大喘气，喘气时肺部伴有杂音，嘴上出现唾沫；走路时身体摇摆失去平衡；虚弱；意识模糊，最后是倒地，死亡。

二、中暑后如何处理？

当狗出现中暑症状后，主人应该马上先采取自救，而不是一味地等待兽医。最重要的是：要尽快使狗的体温降下来。

方法是用凉水冲淋到狗的身体上，也可以把狗放到冷水浴盆里降温。（注意：不能用冰水，冰水会使皮肤的循环速度降低，从而延长降温的时间）。然后应该以最快速度把狗送到兽医诊所。



工作人员在急救中暑的狗狗

1、立即将患犬从高温或日晒环境，转移到阴凉通风处休息或平卧。在休息时可将后腿提高，以增加脑部的血液供

应。

2、用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，在头部置冰袋等方法降温，需注意水温不要过低。因为过低的水温会造成周围血管剧烈收缩，反而达不到散热的效果。也可用酒精擦拭体表，促进散热。

3、中暑的犬容易出现喉部水肿的现象，所以应该注意犬的呼吸状况，并应随时将其颈部伸直，使其呼吸顺畅。



4、及时给患犬口服盐水，同时要把狗狗转移到阴凉处，避免体温再升高。

5、在紧急治疗过程中，要随时注意患犬的体温，当体温降至 38℃ 时，就应立即擦干犬体，让犬安卧休息，周密护理，以免过度散热造成低体温。

注意事项：

1、狗在中暑情况下，一般不会自己喝水。所以狗主要尽快把狗狗送到兽医处，采取点滴和其他方式迅速补充水份和其他药物进行治疗。

2、如果狗狗中暑后出现呕吐现象，应使用辅助工具（如竹筷、笔等）小心地将呕吐物从口中清除，并将头部朝下，避免犬又将呕吐物吸入气管内，造成吸人性肺炎。

3.2、狗狗外出晕车怎么办？

狗狗和人一样，也会出现晕车的症状。狗晕车主要是因为车辆的起伏颠簸、摇摆与机器的噪声、气味，对狗狗的脑神经的前庭平衡感受器产生刺激，从而导致狗晕车现象的出现。

一、狗狗晕车的表现

狗狗一旦晕车，主要表现为：卧地不动，同时出现恶心呕吐，精神也不好，头低腰弓，行动迟缓等。

二、带狗狗乘车要点

1、如果带狗开车出门旅行，哪怕只是短途 1-2 个小时，也最好每隔 30 分钟休息一次。这样能让狗狗可以调整缓解一下，减少晕车几率。

2、不要让狗狗独自在车中。带狗坐车外出，绝对不



可以把狗留在车内，因为阳光直射下（甚至在无阳光的闷热天气）车内温度升高的速度惊人，可能用不了 20 分钟就会要狗的命。

对那些鼻子短的狗，如京叭，更要特殊照顾，因为短鼻子的狗散热更加困难。

三、晕车急救处理与护理

1、口服：茶苯海明。剂量为：20kg 以上狗狗，一次 50mg/次；10-20kg 以上狗狗，一次 25mg/次；10kg 以下狗狗，一次 10-20mg/次。如果狗狗吃下去，开始出现嗜睡、兴奋、鼻镜干燥等现象，为药物反应。大家不必过分担心，一般 10 分钟后症状自行消除。

2、预防：为了预防狗狗晕车，狗主出发前可以去药店买一些苯巴比妥。在乘车前 1 小时，给狗狗口服，具体药量为 1-2mg/kg，也能起到很好的效果。

3.3、溺水

狗狗夏天去游泳或者玩水，有时出现溺水这个意外。而溺水后，最主要的危害是会引起窒息缺氧。

一、溺水症状

狗狗溺水后，会出现昏迷、心律失常、自主呼吸和心跳停止、休克、胃扩张等。



二、溺水后怎么办？

1、立即清除狗狗口鼻中泥沙污物，用包有纱布的手指将舌头拉出口外，恢复呼吸道的通畅。

2、拍打狗狗的腹部 1-2 次，然后用手抓住后肢反复甩动 10-20 下，再把狗狗放下看是否苏醒，如无反应，则重复上述动作。

3、如自主呼吸和心跳已停止，应立即行心肺复苏术：先做口对口人工呼吸，同时双手按住狗狗肋骨两侧，将肺中空气挤出来，使之尽快恢复自主心跳。

3.4、骨折

若然发现你的狗狗出现骨折的情况时，比如它们在步行时一拐一拐的，或是摇摇晃晃的，这些都是狗狗骨折现象。狗主应尽量别让宠物移动，以防止触碰狗狗的患处，导致碎骨容易割伤到血管或神经。

骨折的紧急救治最好在事发当地进行，救护措施包括止血和临时包扎固定，然后迅速送往医院。

1、如有出血，应在伤口上方用绷带、清洁布或绳子等结扎止血或直接压迫股动脉、臂动脉止血，然后用止血带结扎。

一般止血带结扎时间每次不超过 1 小时，每隔半小时可放松止血带 1~2 分钟，以看到鲜血流出为止，可防止因结扎时间过长而引起肢体缺血坏死。



2、伤口表面有明显异物可以取掉，然后用清洁的布类覆盖包扎伤口。对外露的骨折端，不要还纳，以免将污染物带入深层，但要进行保护性包扎。


3、根据事发现场实际情况，就地取材，选取长木板、树枝、纸板等材料作夹板临时固定骨折部。如上肢骨折应用木板将手臂固定，木板长度应超过骨折部位的上、下两个关节面。下肢骨折可用长木板将伤肢缚扎在一起，木板长度上至腋下，下应超过脚爪，或可将患肢与另一健肢缚扎在一起固定。脊柱骨折应由双人平行搬至木板上缚扎固定，颈椎骨折应将头部两侧用沙袋垫好，限制头部活动，然后才能送医院。

这里，“@狗狗知识大全”提醒狗主一下：如果你的狗狗是如吉娃娃，或者博美这类小型犬，更容易发生骨折。

3.5、出血不止

狗狗有时候在外出活动时，会不小心被一些硬物划伤，从而出现出血的现象。狗主先不要慌，应按照以下方法对狗狗进行急救：

1、小量出血



发现狗有出血，应先用东西压迫，以减慢血液的流出或完全止住出血。比如在伤口处放几块干净的纱布，然后用力紧紧地缠在伤口处。

随后观察在包扎处的下方有否肿胀，如果出现肿胀，包扎的绷带必须放松，严重时甚至要完全解开绷带。

2、大量出血

当大一点的动脉出血的时候，会表现为有力地喷射出来。对这种动脉出血，如果用直接压迫的方

法，不单不能减缓狗狗出血，反而会令血液快速溢出，所以处理这类伤口便要用上止血带。

止血带可以是一根绳子--也可以是纱布、普通布--尽快裹在狗狗出血附近处，然后系好（要系在接近心脏一端）。注意：应轻柔地但牢固地扎紧止血带，直至伤口出血明显减少。最后注意，应每隔十分钟松开止血带一次，以使血液能够流进组织中去，减少肢体坏死的隐患。

另外，狗主一旦历史处理好伤口后，便应尽快带狗狗去看医生，这样才安全。

3.6、烫伤（烧伤）

若狗狗不小心被打翻的热水，或是不小心被火烧伤时，狗主要立即以清水来冲洗狗狗伤处。

如果可以的话，最好是让水流不停地冲洗伤口约十分钟。这是因为狗狗的毛很长，水要渗透到毛根处的皮肤是需要花上一段时间。（而且通过持续的水流流过伤口，有助缓和皮肤表面的高温和减低对皮肤组织的破坏）。

狗狗被烫伤（烧伤）治疗要点如下：

1、创面须用清水冲洗后，用干净布包扎或敷创面，防止感染。强酸、强碱和沥青烧伤皮肤时，应用清水充分冲洗，为防止酸、碱残留在伤口内，冲洗时间一般不少于5分钟。

2、四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。眼烧伤时，用生理盐水冲洗后，用棉棍取出异物并滴0.25%氯霉素眼液。

3、手足烧伤包裹时应将指（趾）分开，以防粘连。

4、缺水时可多次少量口服淡盐水，或烧伤饮料（每片含食盐0.3克，碳酸氢钠0.15克，鲁米那0.03克），每服1片，口服白开水100毫升。一般以少量多次为宜，如发生呕吐、腹胀等，应停止口服。要避免给患犬单纯喝白开水或糖水，以免引起脑水肿等并发症。

5、如已经烫起了包，千万不要自行冲破，因为泡破了容易引起感染。

另外，火酒，滴露等消毒药水也不要涂在狗狗伤患处，因为这些药物会令皮肤死得更快。而且，若这些药物被狗狗舔到，又会引起中毒的可能性。所以除了清水或是淡淡的盐水外，不要用其他用品来清洗烧伤或烫伤的伤口。

虽然有人会建议使用含油脂的软膏涂在伤口上，但这个方法的用意旨在降低皮肤的温度，如已用清水清洗过伤口，则可以不用再涂任何药物，当做妥了初步的急救后，就必须尽快带它们往兽医



院去。

3.7、车祸

随着大家现在生活越来越好，很多狗主周末喜欢带自己的狗狗乘车外出。但是在这个过程中，有时会发生一些谁都不想看到的事情。比如：狗狗出了车祸。

尽管这种情况谁也不愿意见到，但是一旦真的发生了车祸，以下这些急救技巧，很可能能挽救狗狗的生命：



狗狗如果车祸中骨折，不要轻易移动

1、如何运输受伤的狗


狗狗车祸受伤--特别是骨折的情况--大家要采用特殊的方法送狗狗，以减少对狗的进一步伤害。

比如：受外伤的狗，可以放在尺寸大小合适的硬质材料表面上运输，如放于三合板上。

木板尤其适用于运输大型犬。篮子或大的毛毯，可作为任何体形狗的担架；而体重小于 20 千克的狗，放于坚固的木箱内运走会较安全；小型狗也可以将其轻柔地卷曲在篮子或毛毯内、抱著走。

2、人工呼吸

人工呼吸是急救狗狗的一项基本手段。我们主要通过人工呼吸，给不再进行呼吸运动的狗补充氧气。



美国一次火灾中，消防员通过人工呼吸抢救狗狗

1、在开始人工呼吸前，我们先要将狗侧躺，张开其嘴巴，然后将它的舌头拉出，仔细检查其喉部，确保呼吸道畅通。清理掉口腔内的一切黏液或血液。

2、然后再把狗嘴合拢上，将它的嘴轻轻握在手中。之后要做的是深呼吸，救护者将狗嘴张开，完全盖住狗的鼻孔，轻轻地呼出空气。将空气小心地送入狗的肺内。

3、观察其胸廓有否膨起。每 5-6 秒钟重覆此动作一次，或每分钟 10-12 次。

3、心脏按摩

心脏按摩只用于心跳已停止的狗。它必须与人

工呼吸一起使用，即是我们平日所听见的“心肺复苏法”。如果使用得当，“心肺复苏法”能使处于紧急状况下的狗恢复呼吸和心脏功能。


正确的心脏按摩程序是：

- 1、将狗向右侧平卧，把双手放于狗胸部左侧心脏的区域，用力按压胸壁，每分钟压70次。
- 2、对于小型狗而言，将双手分放在胸部两侧接近手肘处，每分钟压胸壁约70次。按压的面积，其直径应占整个胸部的20%-30%。
- 3、注意不要用力过度压断肋骨。

3.8、扭伤

狗狗有时候在玩耍或者打斗时，关节会骤然向一侧活动而超过其正常活动度，造成关节周围软组织（如关节囊、韧带、肌腱等）发生撕裂伤，造成扭伤。

1、伤后应尽快进行局部冷敷，以促进血管收缩，减轻渗出，减少新陈代谢产物对神经末梢的刺激和压迫，可起到消肿止痛的作用。冷敷可以用冷水、湿冷毛巾或者干脆买雪糕敷在伤处，至肿胀不再增加为止。



狗狗扭伤三天后的前肢

2、伤后24小时内不要热敷或按摩伤处，因为此时伤处血管破损尚未愈合，热敷和按摩将导致狗狗的血管再度破裂，加重伤情。

3、伤后24小时内出血完全停止时，才开始热疗，以加速局部血液循环，有利于消肿止痛、组织修复、代谢产物和淤血的吸收。热疗可采用热水泡、湿热敷等，有条件可以涂抹红花油、扶他林等药物，疼痛时可口服芬必得等止痛药。如果用活血化瘀、消肿止痛的中药煎汤热敷、浸泡患处，效果会更好。

4、一周后，可以根据患处恢复情况进行恢复性活动。

第四章

让你变成狗狗小医生



掌握一些基本狗狗疾病护理与防护知识，很有用哟~

第四章：让你变成狗狗小医生

很多狗主在自己狗狗生病的时候，非常心疼：恨不得带狗狗去最好的宠物医院、给狗狗买最好的宠物药品。其实，与此相比，更重要的是狗狗疾病预防与护理。

正确的狗狗预防与护理知识，将大大降低你的狗狗的生病几率，这个才是最好的方法。在本章中。“@狗狗知识大全”将为您分享大量的狗狗护理与疾病预防知识。



4.1、带狗狗去医院应该注意什么？

很多狗主是第一次养狗。一旦狗狗生病，着急去医院，却不知道很多医院看病的要点，结果不但没有看好狗狗的病，反而令病情更加加剧，这就不好了。

一、带上垫子

来看病的宠物有时会被要求输液，可是主人们一般都没想到带个垫子什么的。要知道输液台都是金属的，夏天都冰凉，把动物放在上面几个小时，没病也得着凉，而且输液室忙的时候根本就不消毒，就这么直接放上去也不卫生啊。

所以，只要是带动物看病就一定要带上垫子。实在不行，大家带个1、2个狗狗尿垫也可以，大小合适，又暖和~，如果想得起来的话，带个小被子更好。



二、输液速度不可太快

在输液时，有的主人看自己的狗狗的输液速度太慢，就自己调得巨快，这是绝对不行的！

狗狗输液时，快了能要命的！有些药物的分子比较大（象白蛋白），每分钟只能滴几滴，如果滴快了，狗狗的心脏根本受不了。另外注意，过程中狗狗都得小便一次两次，是正常的，所以一定要记得在宠物身子下面垫上纸尿垫！

三、不要扎堆儿去医院

以前在一些网站的论坛上看到：一到周末，几个狗友就相约，带着自己的狗狗去医院一起做绝育或者做疾病的治疗。另外在小小的医院里，还有的女性狗友爱扎堆，把自己的小狗往别人的小狗

旁边凑，想看看小狗们见面是什么反应，这是非常非常危险的！

医院是病毒和病菌集中的地方，去医院的宠物绝大多数是去看病的。让自己的狗和别人的狗接触，很容易因为短暂的接触而交叉传染。万一自己的狗有跳蚤或更严重的传染性疾病，这样的近距离接触已经足够造成交叉传染了。

另外，除了不要让狗狗们互相接触之外，也不要摸别人的宠物，不论是你认识的人还是不认识的人所带的宠物都不要摸，同时也不要让别人抚摸你的宠物，原因同样也是避免交叉传染。

4.2、狗狗的内外科看病要点

一、内科要点

1、内科病以胃肠炎为例，患犬一般表现为拒食、呕吐、拉稀，所以脱水严重，抵抗力低。一般家庭中常配备有黄连素、痢特灵等药，但这些药对犬胃肠炎效果不佳，不太推荐。一般以静脉输液效果最好。



2、在动物医院或在家里给患犬输液时，要注意输液的速度，有无过敏反应，给药后观察下腹部是否出现成片的红疹，是否呕吐，药液何时输完，还有什么药，怎么服用，每天给药次数，药物间有无禁忌等。

3、静脉输液后，犬一天所需的营养已给齐，回家后不必再喂食，但应供应水。

养犬家庭常配备的药物有：庆大霉素、胃复安、维迪康、乳酶生、多酶片、酵母片、复合维生素 B、增食乐、青霉素等。

二、外科要点



1、手术后的病犬应给予易消化的流食，并配合抗菌药，以防止感染。

2、术后，犬常常舔伤口，有时磨、抓、咬患部，养犬者应想办法加以限制。比如给犬的四个爪子穿上袜子，用硬纸板固定犬的头部使其不能回头，固定前肢或后肢的两个关节，以使患犬只能走小步等，这些都是有效的方法。尤其对于耳部血肿和耳淋巴外渗的狗狗，更要防止它们用爪子抓患部。

3、手术后的犬，应在 1 至 2 周内限制其活动，以防止缝线崩开。对于骨折的犬不应给予止痛药，尤其在未治疗前，以防止骨折肢在无痛感的情况下，不适当的运动造成骨折的加剧。

4.3、疫苗知识大全：接种时间、要点与常见问题

一、打疫苗？什么是疫苗？

疫苗实际上是一种经过弱化，降低活力的病毒。用做疫苗的病毒都是经过特殊培养和技术处理的，它的活性比正常的病毒低很多，能够帮助狗狗产生抵抗力，注射过疫苗后，就算以后感染正常的病毒，其抵抗力也足以应对自如了。所以每年给狗狗打疫苗，是非常重要的！



二、免疫注射的时间表

注射疫苗要严格遵循医生制定的免疫时间表，过早给狗狗注射疫苗不仅不会保护小狗的健康，反而会破坏母抗原体的功效，起到相反作用。

- 出生 30 天：滴鼻免疫犬窝咳疫苗；
- 7-8 周：第 1 次 6 联疫苗；
- 11-12 周：第 2 次 6 联疫苗；
- 14-15 周：第 3 次 6 联疫苗；
- 以后每年 1 针 6 联和 1 针狂犬疫苗；

注：以上疫苗接种一次，有效期为一年，不能保证犬终身免疫。



三、选择什么疫苗好呢？

现在时常上有两种疫苗，国产和进口的。进口的虽然价格昂贵，但一般的国产疫苗只能保证半年的防疫有效期，不仅每年都需要打两次，而且有些疫苗在高温的情况下会失去部分效力。所以，如果经济条件许可，还是打进口疫苗比较保险。

四、不适合注射疫苗的 5 种情况

一般来说注射疫苗对狗狗没有危险，但在病态下注射却有生命危险，特别是以下情况是不建议注射疫苗的：

- ◆ 体质比较差、营养不良的狗狗，最好先改善体质，加强营养，直到身体健康后再接种疫苗；
- ◆ 注射前与患病的狗狗接触过，需要全面检查后再注射；
- ◆ 给怀孕母狗注射可能造成流产，是绝对禁止的。动物在怀孕时体内抗体很高，一般不会传染疾病，无须注射，如果实在要打，就只能选用灭活性的疫苗；

- ◆ 产后半个月内狗不适宜接种；
- ◆ 外伤没有愈合的狗狗不适合接种；

五、注射后的问题

- 注射后的狗狗出现体温升高、精神抑郁、食欲下降、疼痛等问题都属正常，一般 2 个小时左右就会没问题；
- 如果出现全身瘙痒、面部肿胀，那就过敏了，要马上到医院注射脱敏针；
- 也有一些狗狗在接种疫苗后几天到十几天内发病，这主要由于接种疫苗的狗狗已经患病，只是处于潜伏期，临床症状还没出现；
- 切记接种疫苗后 10 天内严禁给狗狗洗澡，以防肌体抵抗能力降低；



六、狗狗注射疫苗有时为什么会失败？

狗狗注射疫苗后，依然感染了免疫范围内的疾病。心疼的主人不禁要问：“疫苗也不保险吗？”大量研究和临床应用结果证明，注射疫苗的确是预防狗狗传染病的好办法。但是，疫苗的保护率为 90%~95%，并非百分之百的绝对保险。

影响疫苗效果的因素很多，掌握这些知识，有助于进一步提高疫苗的保护作用。

1、抗体不足。注射疫苗后能否预防疾病，取决于疫苗能否刺激狗狗产生抗体，以及抗体的多少（用滴度表示）。一般认为，血清抗体滴度大于每毫升 10 个国际单位时，才能预防传染病。

2、已经感染病毒。即使注射疫苗前给狗狗做了检查，各项指标正常，仍有可能因处于发病的潜伏期而检查不出来。疫苗产生的抗体只对血液中的病毒有效，对已经进入细胞的病毒无效。所以，如果注射疫苗前已经感染了病毒，则注射疫苗无效。



3、保存不当。疫苗不宜冰冻，冰冻可破坏其结构。37℃ 保存不宜超过 1 个月，4℃ 保存不宜超过 1 年。保存时间过长，免疫效果会降低。家用冰箱冷藏室保存即可。

4、使用不当。疫苗不宜在臀部注射。臀部脂肪组织多，免疫活性细胞少，注射后产生的抗体滴度低，抗体下降速度快。

5、病毒的变异。即使注射疫苗产生了高滴度的抗体，少数狗狗仍有得病的可能。这是因为病毒可

以发生变异，而现有的疫苗是针对正常病毒。如果病毒表面抗原发生了突变，注射疫苗的狗狗不幸感染了这种变异病毒，就仍有可能得病。

6、健康状况不佳。例如寄生虫未清除干净、有高烧等，造成免疫失败。

7、注射时机不对。多半是太早，在移行抗体还很多时注射，一部分抗原就被抵消掉，当然能产生的功能就大打折扣。或未遵照医师嘱咐补强——超过一年以上仍未追加，当然仍有可能感染，因为疫苗效果只能维持一年。

4.4、怎么给狗狗滴眼药？

如果狗狗发生眼部疾病，经常需要家长为狗狗清洁眼部。那么如何给狗狗滴眼药水呢？“@狗狗知识大全”为您介绍一下相关要点：

一、使用滴眼液

准备工具：脱脂棉、洗眼液


- 1、在狗狗用药之前，先轻轻地使毛软化，然后用脱脂棉轻轻擦去眼角周围的脏物。
- 2、使用温水或由医生提供的专用洗眼液，来给狗狗清洁眼球。同时在清洗过程中，注意不要把棉花纤维留在眼睛上。
- 3、轻轻抱住狗狗，然后轻轻地掰开眼睑。为避免惊吓到狗狗，手拿着眼药水从后上方接近眼睛，然后将数滴药水滴加到眼睛里。在治疗时，应该让狗狗眼睛在药水中浸泡几分钟。

二、使用眼药膏

准备工具：眼药膏

1、很多情况下，您不得不用软膏来治疗眼病。使用时，将软膏挤在下眼睑内侧并成直线行，在上药过程中，不要让软膏管喷嘴接触到眼睛。

2、两手轻轻用力把狗狗的眼睑闭上，那样可以让软膏随着体温慢慢溶解病分布到整个眼睛。



4.5、狗狗爬楼伤筋骨

小狗自行上下楼梯，对主人来说是省心省力，殊不知对小狗未必是好事，特别是一些小型犬以及

关节易受损的犬种，如金毛。



以北京犬为例：北京犬上楼时，因台阶宽度有限，四足无法同时踏在同一级台阶上，几乎每爬一级台阶都必须用后足用力拱起背和腰，然而再腾出前足攀登上方的台阶。

每上一级台阶小狗就要“体前屈”一次，对腰椎和四肢关节韧带带来一次高强度的弯折和拉伸，其强度不亚于普通人做一次“弯腰并手指触地拉韧带”运动。

长此以往势必造成小狗的腰椎或四肢关节的损伤，容易出现运动功能障碍，严重的会患上腰椎骨刺或关节炎等运动器官疾病。

每当看见很多小狗狗，在其主人的喝彩和鼓励声中，一口气直冲上好几层楼梯，真是于心不忍。在这里我要对所有的爱狗人说一声：为了你家小狗儿的健康，还是费些劲儿抱着上下楼吧。

4.5、狗狗真假感冒识别

狗狗感冒分真假感冒。犬的真感冒，是以上呼吸道粘膜炎症为主要特征。

许多传染病的早期症状是和感冒的症状是很相像的。如犬温热的早期症状，细小病毒病的早期症状等，在临床上一般以体温升高、打喷嚏、羞明流泪、流水样鼻液等症状为主。由于经验不足，部分主人容易将常见的严重传染病当感冒治疗，因此而造成误诊和错误的治疗措施，引致犬死亡的严重后果。

假感冒一般在传染病的初期比较常见，实际上还有另外的特殊症状。当犬感染了犬温热病毒而发病时，体温一般是双向热，体温时高时低，大多数病犬有眼屎的症状出现。而细小病毒的早期，则主要伴有呕吐、腹泻等主要症状，并且一般是先吐后泻。只要主人能够认真观察，还是可以进行分辨和判断的。

感冒一般多发于早春、晚秋和气候变化骤然的时候。病因多数是由于突然遭受冷刺激，如冬季遇贼风侵袭、寒冷季节露宿、被雨淋、给犬洗澡后没有及时将毛吹干等情况。




犬患感冒的主要症状表现在：病犬精神沉郁，食欲减退或废绝，眼结膜潮红，眼睛羞明流泪。有咳嗽现象，鼻涕呈脓液状，呼吸加快，体温升高，恶寒战栗，如不及时治疗则有可能并发气管炎，支气管炎等其它疾病。

4.6、各种病症的看护知识

一、呕吐时：

狗是很容易呕吐的动物，若在呕吐前后并无异常现象，尤其在呕吐后狗又去吃呕吐物时，则不要紧。



但狗狗若一天内呕吐数次，呕吐后想喝水，但喝下的水又吐出，如此反复，这就很严重。注意只要给能够润湿口腔的水量就可以，有很多饲主不明情况而尽量给水，反会使症状恶化。

二、下痢时：

下痢是因肠内物质通过快速或肠粘膜病变，肠粘膜分泌亢进而致。

如果下痢不很严重，食欲不振时，尽量给狗狗一些所喜欢的食物，但绝对不可给不易消化的食物。若一天下痢的次数很多，最好整天不予食病情才易减轻。绝食后可用流质食物，如稀饭汤等少量分数次喂食，然后再逐渐从粥过度柔软的米饭，再过度到普通食物。

三、食欲不振时：

食欲不振是因病引起，疾病未愈自然不会有食欲，但若狗不呕吐、饿心，就可用橡皮管强行灌入少量流质食物，或是用手将肉丸塞入它口中，有时这种方法会使狗产生食欲。

四、流鼻水、眼屎时：

有的疾病会有鼻水，尤其是感冒时，此时用脱脂棉或棉棒擦拭，擦拭干净后，为避免鼻头干燥龟裂，可涂抹橄榄油。

有眼屎时可以用百分之二的硼酸水以棉花沾取擦拭，然后再点上无刺激性的眼药水。



五、高烧时：

发烧由生病引起，是身体与疾病抵抗的表现，如果应该发烧的疾病，相反体温却很低时，就表示病情严重，高烧若持续过久会使体力衰弱，一定要做降低体温的措施。

发高烧时会使脉搏跳动加速，呼吸频率增加以致呼吸困难，这些都应特别注意。发烧时最重要的是保持安静，有时体温上升会感到寒冷而发抖(尤其是冬季)，这就要将被褥铺厚，并准备热水袋和

暖气器具，同时不使风自狗舍间隙吹入。

六、咳嗽时：

咳嗽是从气管把分泌物或异物排出的一种防御反应的动作，无痰者为干咳，有痰者称为湿咳。

咳嗽多半在进食时、运动时、吠叫时发生，患有各种呼吸系统疾病及心脏病时容易咳嗽，咳嗽过分激烈时会将痰与胃内食物吐出。

对咳嗽的照顾是使狗安静，不再运动。



七、皮肤病：

人的皮肤 PH 值是 4.5--6.0，属酸性，可预防细菌与霉菌的生长，同时也可抵抗物理化学的刺激而保护皮肤，在酸性皮肤上，细菌不易繁殖。而 95% 的狗皮肤 PH 值 6.2--8.6，在弱酸性与碱性之间，因此容易感染细菌而患皮肤病，尤其在夏天，PH 值更高，成为细菌繁殖的温床。

狗狗为了应付夏季的炎热，调节体温使皮肤血管扩张，内脏中的血液减少，造成消化机能减弱，皮脂腺皮脂分泌减少，容易遭受外部刺激而发炎。所以夏季和那些常年温暖湿润的地区，狗很容易患皮肤病。



皮肤病难免会痒，狗会搔抓而使病情恶化，同时，使用的外用药会被狗舔进去而引起中毒，所以要注意制止狗舔药。此时可用薄皮或厚纸做成圆形的颈环，套在犬的颈部，可防止犬在皮肤病发痒时去咬患处。

至于兽医所处方的外用药使用法不仅仅是涂上而已，还要用手抹匀，让患处吸收，常看到有些饲主在患处涂上厚厚的软膏，这是不对的。

4.7、怎么喂狗吃药？

一、怎样喂任性的狗狗吃药？

1、用两腿紧紧夹住狗狗、两膝卡住它的肩部，使它不能跑掉。用一只手抓住它的口鼻部，另一只手抓住它的下颌把嘴打开。注意别被它咬了。

2、把药放在食物中喂食隐藏药片。如果简单地把药放在碗里，不能保证狗儿会把药和食物一起吞

下。最好把药片夹在一小片它喜欢吃的食物里。比如将药片夹在大块肉里。多数狗只都能接受。药片放在面包中间也行。也可以把药溶狗儿爱吃的其他食物里。不过无论用什么方法都应先与兽医商量, 因为有些食物是不能与某些药物同时食用的。

3、如果狗儿拒绝吞药片, 可以把药片捣碎混在糖水里, 用注射器打入它的嘴里。咳嗽药水也可以用注射器喂食。

4、把药片尽量放入狗儿的舌后部, 然后把犬头稍稍抬起、扫扫它的喉部, 但仍要略略上抬起它的下巴。狗儿吞药后要表扬它把两膝紧紧夹住狗儿, 这样你的两手可以空出来。



二、3种常见的狗狗喂药法

1、拌食投药法

本法适合于尚有食欲的犬, 且无异常气味、无刺激性、用量又少的药物。投药时, 把药物与犬最爱吃的食物拌匀, 让犬自行吃下去。为使犬能顺利吃完拌药的食物, 最好吃药前先让犬饿一顿。

2、口服法(灌服法)

也称灌服法。就是强行将药物经口给犬灌入胃内。因此, 不论病犬有无食欲, 只要药物剂量不多, 又无明显刺激性, 都可采用此法。灌服前, 先将药物加入少量水, 调制成泥膏或稀糊状。

灌药时, 将犬站立抱定或侧卧抱定, 助手用手抓住犬的上下颌, 将其上下分开, 投药者用圆钝头的竹片刮取泥膏状药物, 直接将药涂于舌根部, 或用小匙在口腔深部或舌根上, 慢慢松开手, 让犬自行咽下。

至于胶囊或片剂, 可在打开口腔后, 用药匙或竹片将药片送到口腔深部的舌根上迅速合拢口腔, 并轻轻叩打下颌, 以促使犬将药物咽下。



3、胃管投药法

对大剂量的液体药物应用此法比较合适。本法操作简单, 安全可靠, 且不浪费药物。应用胃管投药时, 应先准备一个金属的或硬质木料制成的纺锤形带手柄的开口器, 表面要光滑, 开口器的正中要有一个插胃管的小孔。再准备一根投药管(可用胶皮管或塑料管。也可用人用14号导尿管代替)。

投药时，大犬应采取坐立姿势抱定，幼犬可将前躯抬高呈竖直姿势。助手将纺锤形开口器放入口内，任犬咬紧，并用绳子将开口器固定在口角处，投药者手持涂有润滑剂的胃管，自开口器的小孔内插入，缓慢地把药液向咽部推进，随犬的吞咽动作将胃管推入食管内。

药液灌完后，用注射器推芯将管内剩余的药液全部推入胃内，然后捏住胃管口，缓缓拔出。这样可防止残留在胃管中的药液误入气管。

用过的胃管应洗净后，再用0.1%新洁尔灭溶液浸泡消毒即可。

注意事项：

1、要特别注意，给狗狗口灌药时，犬头不能抬得过高，嘴不可高于耳朵，灌药的动作要慢，要有耐心，切忌粗暴，以免灌入气管及肺内。对有刺激性的水剂药物，特别是剂量大时，则不适合口服。

4.8、脱毛的护理

如果你的狗狗之前有脱毛的问题，你可以看看以下6点，你是否注意了：

1、你是否经常给狗狗梳理皮毛？

经常给狗狗梳理皮毛，有助于减少狗狗正常代谢所产生的皮毛淤积，并且可以使狗狗的毛更加强韧和顺滑。你有没有发现，经常抚摸的额头就非常光滑，掉毛也少。经常性地梳理皮毛，狗狗也很非常舒服。



2、你是否经常把狗狗放在室内，少有接触阳光？

狗狗掉毛比较严重，跟长期在房间内活动有一定的关系。良好的阳光照射有助于保证狗狗的皮毛健康。

3、天热的时候，是否洗澡过勤？

洗澡过勤等同于拔毛！洗澡过勤，会破坏狗狗皮毛的正常保护物质，同样会造成小狗的过多掉毛。就算是换毛季节，一星期洗一次就已经是非常多了。平时可用潮湿的毛巾，给外出回来的狗狗做简单的擦拭即可。

4、你经常带狗狗去什么地方散步？

如果是草地、灌木丛、树林等地，狗狗的皮毛很可能已经染上螨虫或者虱蚤，甚至是肠道寄生虫。

这些都会直接导致严重掉毛。看看身上是否有黑点，再看看狗狗的粪便里有没有白点。如果有这些现象，赶快用药。目前有药片的，滴液的，一次使用的和可反复使用的，很多种。选择一种即可。注意品牌，有些劣质的可能会造成它们中毒。另外春秋季吃些驱虫药也很必要。

5、你给狗狗洗澡用的什么洗发水？

不能用人用的洗发水。狗狗的皮肤趋于中性，而我们的洗发水大多偏于碱性。你这样会让它皮肤干燥，细菌以及螨虫就会趁虚而入，造成严重的掉毛。

你应该用狗狗的专用洗毛水，这样才是爱它。



6、你是不是给狗狗吃人类的饭菜呢？

不能你吃什么狗狗跟着吃什么。狗狗吃的过咸也会导致它掉毛，甚至是局部掉毛。包括甜的、辣的、刺激性、增味素的食物都会引起狗狗的掉毛。

最好吃专业狗粮，因为狗粮是含盐的，这样能保证它们的肌肉力量，但有专业的比例控制。

而我们的饭菜盐分绝对是明显偏高的，这些东西的长期摄入，都会影响狗狗的皮毛。狗狗总是很喜欢你饭碗里东西，如果一定要给它吃，最好用水煮过，这样对它的皮毛会有很大的帮助。

4.9、降低狗狗皮屑多的方法

其实，在正常的新陈代谢下，狗狗的表皮细胞会不断的生长、老化，死亡并且脱落的。此外，狗狗感染寄生虫，细菌，真菌，过敏反应或者皮肤发炎等病症，也会使皮屑变得更多。想要有效的除去狗狗皮屑，大家要注意以下要点：



1、冲个澡：

好好帮你的狗狗洗个澡，就可以很好除掉皮肤上积攒的老旧皮屑。

洗澡不用太积极，基本上夏天每两周洗一次，冬天每个月洗一次就差不多了，要小心，太过频繁的洗澡，有可能会破坏狗狗毛上的油性保护层哦。

另外狗主要注意：洗澡时，要用微温的水；

要注意避开眼睛，最后要记得把狗狗潮湿的毛发吹干。

2、勤梳毛：


定期为狗狗梳毛，可以使平时积攒的老旧皮屑和死毛刷掉，也能帮助狗狗将皮肤分泌的天然油脂平均分布在每一寸皮肤上，只要经常梳毛，很多掉皮屑的问题都可以自然解决。

在选择梳子的时候要注意梳齿是否过硬。可以用自己的手背试一试。如果觉得痛，那狗狗很可能也会有同样的感觉，其实，人用来梳头的齿梳就很适合给狗狗用，更进一步也可以选用专用的宠物美容梳。

3、改变饲料：

有些品质较差的饲料，无法满足狗狗个营养需要，会导致毛发健康状况不良，许多狗狗在改用另一种较专业的饲料后，皮屑问题就自然痊愈了。

同时，皮屑大增的一个原因也可能是食物中的油量不足。如果是因为油量不足，可以在食物中添加适量的宠物专用鱼油，这可以帮助皮肤恢复正常的代谢功能。



4、用药：

如果你的狗狗经过确诊，皮屑多是因为细菌导致的，比如：寄生虫，细菌，真菌等，那你就应使用一些抗生素以及皮炎的药品，这样可以降低狗狗皮屑的几率。

注意事项：

- 1、千万不要用人用的去屑洗发水替狗狗洗澡，免得产生更大刺激。
- 2、狗狗有严重皮屑时，最好别用含有杀虱成分的洗毛精替它们洗澡，这类产品多半会使皮肤更加干燥。

4.10、小狗狗为什么易得“细小”和“犬瘟”？

“@狗狗知识大全”前几天在新浪微博的答疑中发现，有一位朋友说：自己已经养了好几次小狗了，但是有2只狗狗都是不到1岁，就因为得上狗瘟走了。

为什么有的朋友养狗狗，总是容易得上“犬瘟”或者“细小”这类传染病呢？其实狗狗先天体质差不了多少，最主要的原因就是狗主护理不当导致的：

一、过分的逆爱，是造成得“细小”的祸手

1、喂牛奶。

给狗狗喂牛奶是最严重的错误。人喝牛奶是好事，但是狗狗与人不同。因为牛奶里含有乳糖，而乳糖分解成葡萄糖才能被狗狗消化吸收。而狗狗身体里的消化葡萄糖的酶体的量较低，通常不能把牛奶中的乳糖全部分解。

并且牛奶颗粒比较大。也不利于狗狗的吸收。建议给狗狗喝羊奶或者狗专用牛奶。

2、食品过咸过油。

食品过咸过油，是导致狗狗容易得上传染病的第二原因。有些狗粮，特别是很多价格低廉的狗粮，非常油，狗狗吃完后，非常容易拉稀，从而导致感染犬瘟或者细小。这是幼狗食品质量问题。



3、给小狗吃剩饭。

给小狗剩食的喂养是第三危害。狗的一生不该吃剩食，不管是谁剩的，要想不浪费食物，有很多方法，狗决不是剩余食物的垃圾桶。

4、免疫失败

有些狗主为了省事，有时候就去路边的卖狗小铺给狗狗打预防针，这是不对的。（更有些狗主干脆不打，这更是非常非常不对的！）。一定要按时给狗狗打预防针，而且要到信誉良好的宠物医院做免疫，这样对狗狗才是安全的！

二、时尚心理，是造成得“狗狗瘟”的祸手

很多狗主，特别是女性朋友，有时候会非常喜欢“秀”自己的狗狗。正常的“秀”自己的狗狗是没问题的，但是不要过早、过度“秀”狗狗。以下这些行为都是不对的：



1、在狗狗还非常幼小时，就提早展示自己的小狗。

2、提早外出溜狗。（未打完所有免疫之前不要外出）

3、把食物丢在地上喂狗。

4、溜狗时没有养成好的溜狗习惯：A、小狗到处乱闻；B、溜狗时站在一处同人聊天；C、小狗挖坑吃土。

5、免疫失败。（如果免疫失败，病好后 15-20 日后重新做免疫）。

4.11、狗狗四季疾病防御——春季篇

春天日照时间变长，狗身体的新陈代谢也会随之增强。与此同时，在暖暖的春风里，一些疾病也开始复苏活跃。尤其是犬瘟热、犬细小病毒、副流感、皮肤病等疾病。

1、皮肤病

春天日照时间变长，狗身体的新陈代谢也会随之增强。这时狗狗开始换新毛，身体需要充足的营养，如果营养不足就会产生皮肤病。



另外，紫外线的刺激，毛囊虫寄生、细菌、真菌的感染等都可以引起皮肤病。同时在春天气温上升时，跳蚤也开始活动。因此，也要小心跳蚤这类寄生虫导致的皮肤疾病。

2、犬瘟热


犬瘟热是由犬瘟热病毒引起的犬的一种高度接触性、致死性传染病。早期为双相体温热型，症状类似感冒。随后，以支气管炎、

卡他性肺炎、胃肠炎为特征。病后期可见有神经症状，如痉挛、抽搐。部分病犬可出现鼻部和脚垫高度角化。

本病一年四季均可发生，但以冬、春季多发。本病有一定的周期性，每 3 年一次大流行。不同年龄、性别和品种的犬均可感染，但以未成年的幼犬最为易感。纯种犬、警犬比土种犬易感性高，而且病情反应重，死亡率高。

3、犬细小病毒病

犬细小病毒病是犬的一种具有高度接触传染的烈性传染病。临床上以急性出血性肠炎和心肌炎为特性。本病一年四季均可发生，但以天气寒冷的冬、春季多发。病犬的粪便中含毒量最高。



犬细小病毒对犬具有高度接触传染性，各种年龄的犬均可感染。但以刚断奶至

90 日龄的犬发病较多，病情也较严重。幼犬有的可呈现心肌炎症状而突然死亡。据临床发病犬的

种类来看，纯种及外来犬比土种犬发病率高。

对于犬瘟热和犬细小病毒，其预防办法是定期进行免疫接种相应疫苗。具体免疫程序请咨询动物医院的专业医生。

4.12、狗狗四季疾病防御——夏季篇

1、肠胃障碍：

6、7月份是肠胃疾病的高峰期，要特别注意卫生，选择易消化的食物，彻底丢掉剩余的食品，每天更换饮水，狗狗食盆也要洗净消毒。在户外要把狗狗拴在阴凉通风处，并给与足够的饮水。



夏天，要注意狗狗的外耳炎问题

2、外耳炎：

夏季炎热，犬游泳和洗澡的次数较多，要擦干净残余在外耳道的水。

3、心丝虫病：

蚊虫是心丝虫病的主要传染媒介，夏季要考虑夜晚的蚊虫驱赶，并且要将狗窝设在通风处。

注意事项：

1、如果观察到爱宠精神不佳，流眼泪或鼻涕，打喷嚏，咳嗽，体温升高或腹泻等症状，应及时到医院就诊治疗，以免耽误病情。

4.13、狗狗四季疾病防御——秋季篇



秋季里常见的呼吸道疾病主要是由病毒和细菌感染引起，要特别注意感冒，另外佝偻病，虫子叮咬也要注意。

1、感冒：

秋天早晚凉，昼夜温差大，这是造成狗狗感冒的重要原因。尤其是短鼻子的犬，例如：北京犬，西施犬这类等小型犬，容易感冒，要注意保暖。

另外给宠物洗澡时，稍不留神也会造成它们感冒，这个季节它们“犬洗”后一定要用吹风机吹干，

吹风的温度不要过高，那样也容易引起感冒。

2、佝偻病：

秋天日照时间渐短，紫外线照射不足容易让狗狗引起佝偻病，而成年犬易患软骨病。要勤晒太阳，这样有助于吸收紫外线，刺激皮肤中维生素 d 的吸收，促进骨骼发育。

3、皮肤瘙痒



在天气转凉后，应适当减少洗澡的次数，一般 10~15 天洗一次就可以了。洗澡时应注意避免着凉。秋季皮肤会变干燥，易产生皮肤瘙痒和皮屑增多，建议使用有滋润止痒作用的犬用浴液。

4、减肥

狗在秋季的食欲旺盛，这是为过冬而储备皮下脂肪的正常生理现象。若是吃得过多会发胖。如果狗的体重直线上升，并能直接感觉到它的赘肉，就应及时给它减肥了。


天气好的时候，让狗狗多做些户外运动，有助于防止肥胖。

4.14、狗狗四季疾病防御——冬季篇

对狗狗而言，冬季是很多种疾病的高发期，主要包括犬瘟热、还有感冒、犬冠状病毒感染、消化不良等。

1、犬瘟

到了冬天，又是犬瘟的高发季节。狗瘟主要是从其他狗只传染得来的，尤其是从不卫生的地方买来的小狗。狗狗病患，一时看不出，但是 1、2 星期以后，患有这些疾病的狗只会食欲不振、咳嗽、眼和鼻流出黄而浓的液体，严重的会带有恶臭的腹泻和呕吐。唯一可以防止发病的方法是经常接受防疫注射及与其他狗只隔离。



2、流行性感冒病毒

很多朋友到了冬天会暖气或者开空调，就不注意室内通风。但是这样，狗狗气管发炎的机会就会很大，副流行性感冒病毒亦很快传播开去。预防方法是保持室内空气清新。

3、冠状病毒

再来说一下冠状病毒，犬冠状病毒可使狗狗发生程度不同的胃肠炎症状。特征是频繁呕吐、腹泻、厌食、脱水等。其中这种病一年四季均有发生，只不过冬季更为多见罢了。

这种病在狗与狗之间通过呼吸道、消化道感染，一旦发生，同窝、同室的狗狗很难避免不受感染。此病的临床症状轻重不一，有的狗狗并没有明显症状，而有的狗狗则可能呈现致死性胃肠炎。



一旦得病，狗狗通常会表现为嗜睡、衰弱、厌食。初期可见有持续性数天呕吐，随后出现腹泻、粪便稀液或呈水样，有时粪便中混有粘液及少量血液。得该病的幼犬有一定的死亡率，成年犬症状一般不如幼犬重，对症治疗后7至10天大多数可以康复。

4、消化不良

另外，春节期间，要避免狗狗因食物太多而引起的消化不良，降低肠胃下痢和呕吐的几率。

如果你的狗狗吃完饭后，会伴有少许不消化食物残渣时，同时狗狗有口臭等症状（积食导致），此时应马上减少饮食量，予以调整，可避免腹泻的发生。

第五章

常见犬种保健小知识



本章中，为您简单介绍一些常见狗种的易得疾病。

第五章：常见犬种保健小知识

在本章中，“@狗狗知识大全”为您介绍一些常见的犬种，比较容易得上的疾病。

希望通过这些介绍，能帮助各位狗主在日常生活中，更有效的护理好自己的狗狗。



5.1、西施犬

西施犬属于长毛犬，所以至少每周梳理被毛 1 次。梳理时要慢慢地、一层一层地梳，不要只梳理上毛而忽视梳理下毛，否则长时间不梳理下毛就会纠缠在一起，形成死结。

同时注意不要让毛掉到耳朵或眼睛里去。

西施犬的耳部下垂，耳部被毛发覆盖，极易生成耳垢，故应定期进行耳部护理。

西施犬的眼睛大而圆，外露面积大，容易感染细菌引起角膜炎，每天宜用浸湿的脱脂棉或毛巾小心地擦拭眼部和口吻部。可定时短程散步或自由奔跑，每隔 1-2 周可洗澡 1 次。



西施犬的毛长而脆，容易折断和脱落。所以，除了梳毛之外还应扎毛，这对于保护长毛十分重要。

对于西施犬全身的长毛都要捆绑，可分为几个部分，分得越细越好，用橡皮筋分别捆扎；还要扎耳部附近的长毛，但切勿绑耳尖；面部两边的长毛也应扎起，以免吃食时弄脏长毛。额部中间

的顶毛应梳成辫子，既美观又保护眼睛。

5.2、博美犬

博美犬活泼好动，应每日让它在户外运动或散步。由于博美犬的被毛丰厚，需细心梳理、洗涤，否则下毛会缠结，易生虱子和积聚细菌。而且解结时会脱毛过多，甚至引起皮炎。每周应梳理 1-2 次为佳。

为保持美观造型，还应对被毛定期修剪。同时，为保持博美犬丰厚亮丽的被毛，饲料中应注意添加一些维生素 A、B 以及鲜鱼肉等。此犬换毛时脱毛较重，需经常梳刷和整理被毛。

博美犬的耳道易患病，应每周检查和清洁。此外，脚爪趾甲（指甲）生长迅速，应及时剪短。四肢骨骼纤细，故应避免从高处跳下而导致骨折等意外伤害的发生。

5.3、金毛

金色被毛是金毛猎犬的魅力所在。为保持皮毛的美感，预防皮肤病，每天要梳理皮毛。如不梳理，有可能患皮炎。

此外，高热量和高脂肪饮食以及通气性差的环境，也是诱发金毛皮炎的原因。

除了皮肤病外，还应注意耳部疾病。金毛猎犬耳朵下垂，耳道被毛发遮盖，通气性差，易生成耳垢，引发外耳炎，故应每周清理 1 次耳朵。可用棉棒或脱脂棉蘸上洗耳剂，清除耳中的污物。




5.4、吉娃娃

吉娃娃怕冷，所以冬天要给予特别的照顾，如用电暖气给犬加温，或给犬穿保暖的衣服。另外吉娃娃犬与其他的犬种相比，在体力方面尚显不足，因此应注意日常的健康管理。

吉娃娃犬的眼睛大，并向外凸出，应注意眼部疾病的发生。当犬用前肢挠眼，或眼屎以及眼颜色发生变化时，应立刻请兽医诊治。

对幼犬来说，不要给其头部、关节以及腰骨增加负担。尤其是吉娃娃犬的头部经受不住撞击，跑动过程中碰到家具上，或从楼梯或椅子上下来，都有可能发生危险。因此，应注意不要让吉娃娃犬爬到高处，家具角等也最好用软东西包起来。



吉娃娃犬必须用软毛刷子来梳理，趾甲定期修剪，耳朵要随时清洁。

5.5、拉布拉多犬



清除。耳部清洁每周 1 次即可。

被毛的护理每天必不可少，应注意的是，进入换毛期后脱毛增多，如不及时护理，皮肤通气性较差，容易引发皮肤病。可用专用刷子将脱毛梳理干净。

拉布拉多犬是一种比较爱吃的狗狗，所以“@狗狗知识大全”相信各位朋友很容易猜出，拉拉容易得什么病了。没错，就是肥胖。各位狗主一定要管住拉拉的嘴。

另外，拉布拉多犬的耳朵呈下垂状，通气性较差，必须对其进行清理。每天在进行皮肤护理的同时，应仔细检查耳道，发现有污物时，用棉棒或脱脂棉蘸上洗耳剂予以

5.6、哈士奇

哈士奇活泼，非常愿意接近人类，也很乐观。

不过哈士奇最大的一个毛病，就是“撒手没”，就是非常爱亲近他人，相信别人，带出去非常容易丢失。

(不过这个也不应该算是哈士奇的缺点，因为哈士奇是一种工作犬，亲近人类是狗狗应该的本能，所以大家也不要太苛求小哈狗狗了)。



从遗传上看，哈士奇容易患原发性高血压、圆盘状红斑型狼疮、毛囊形成不全、异色鼻、遗传性肾性尿频症、皮脂腺瘤、血管周皮瘤、肛周腺瘤、真性癫痫、眼睑内翻、慢性表在性角膜炎、原发性青光眼、瞳孔膜残留、白内障、遗传性心肥大、输尿管异位、咽麻痹等症。

5.7、比熊犬

比熊犬感受性强，能冷静判断状况，奔跑敏捷。这是一种很开朗活泼、温顺的小型犬只。

遗传的角度来看，比熊犬易发生动脉管开存、遗传性少毛症、B 型血友病、小脑性震颤、环轴椎亚脱臼、眼睑内翻症、



角膜变性、白内障、胱氨酸尿结石、磷酸镁铵尿结石，以及磷酸钙尿结石症等疾病。

5.8、萨摩耶

萨摩耶狗狗在遗传方面多发肺动脉狭窄、主动脉瓣狭窄、心房间隔缺损、糖尿病、成犬发症型成长荷尔蒙反映性皮肤病、肛周腺肿、遗传性听觉困难、小脑畸形、脑回缺损、泪点发育不全、难治性角膜溃疡、白内障、进行性视网膜萎缩、视神经欠缺、家族性肾脏疾病、髋关节发育不良、胃扭转等疾病。

以上这些疾病，狗主都应该加以注意。



第六章

狗狗疾病大全列表



本章中，为您补充各种狗狗疾病，供您日常参考。

第六章：疾病大全列表

通过前几章，“@狗狗知识大全”已经把狗狗各种常见疾病，给大家做了详细的介绍。但是还有一些狗狗不太常见的疾病，这里也简单为大家罗列一下，大家之作参考即可。

(注：本章内容为补充性资料。各位朋友如没有时间，本章可以直接跳过。)

6.1、传染性肝炎

病毒性肝炎是由腺病毒引起的传染病。病狗的唾液、粪、尿均带毒。病愈的狗可长期排毒。该病经口或接触传染。由于病毒对外界环境的抵抗力强，故病狗用过的东西要彻底消毒。2--3月龄的小狗特别易感。死亡率20%左右。病狗痊愈后有持久的免疫力。

- - 病原：传染性肝炎，是由传染性肝炎病毒引起的犬的一种急性、败血性传染病。

- - 症状：潜伏期短，感染约2-6天发病，易感犬与病犬自然接触后通常在6--9天后表现症状。精神差，食欲下降，渴欲增高，体温升高达40℃以上，持续1--6天。有时呕吐，常常腹泻，粪便有时带血。大多数病例表现为软骨部位的腹痛。很少出现黄疸。在急性症状消失后7--10天，约有25%的康复犬的一眼或双眼出现暂时性角膜混浊（眼色素层炎），颜色发蓝。病程较犬瘟热短得多，大约在2周内恢复或死亡。

- - 预防：目前市面上的疫苗多是与犬瘟热等制成的联苗。一般在第9周龄时进行第一次免疫接种，然后在第15-周龄时再接种一次。成年犬需每年接种一次。

6.2、狂犬病

- - 病原：狂犬病又称疯狗病或恐水病，是由狂犬病病毒引起的一种急性接触性传染病。症状为各种形式的兴奋和麻痹。

- - 症状：潜伏期长短变化很大，一般为20~60天，最短8天，也有长达十几年的。症状有两种类型，即狂暴型和麻痹型。

- - 狂暴型的病犬在初期精神差，有时烦躁，常躲在暗处不愿出来，爱吃异物。吞咽时伸颈，瞳孔散大，唾液增多。经过半天到两天，此时兴奋狂暴往往与沉郁交替出现，兴奋狂暴时，常攻击主人，之后病犬疲劳，卧地不动，但不久又起，出现特殊的斜视和惶恐，当再次受到外界刺激时，又出现一次新的发作。疯狂地攻击人、畜，自咬四肢、尾巴和阴部等处。病犬不认家。2~4天后，病情进入末期即麻痹期。此时下颌下垂，舌脱出口外，流涎多，不久后驱麻痹，走路摇摆，卧地不起，最后死亡。

- - 麻痹型，仅经过短期的兴奋期即转入麻痹期。主要表现喉头、下颌、后驱麻痹、流涎、张口

和吞咽困难等，经 2~4 天死亡。

- - 防治：定期预防注射（用弱毒苗或灭活苗）。将病犬扑杀。人、犬怀疑被病狗咬伤时，应彻底消毒伤口，挤出淤血，局部用肥皂水、0.1%升汞水、酒精、碘酊消毒，用血清治疗或免疫接种。

- - 狂犬病能传染人，人若被有狂犬病或疑似狂犬病的动物咬伤，应迅速用清水、20%肥皂水反复冲洗至少 20 分钟，再用 70%酒精或碘酊充分消毒伤口，及早接种狂犬病疫苗，同时结合注射狂犬病免疫血清。

6.3、伪狂犬病

伪狂犬病是由伪狂犬病毒所致的哺乳动物急性传染病。本病自然发生于牛、犬、猫、鼠、猪；由于病毒对外界环境的抵抗力很强，犬吃了患伪狂犬病的猪、鼠、内脏而感染，也可经皮肤伤口感染。感染发病后 100%死亡。病毒对漂白粉、甲醛溶液等消毒药抵抗力不强，可用于消毒。

- - 病原：伪狂犬病又叫阿氏病，是由伪狂犬病病毒所致的犬的一种急性传染病。其特征为发热，奇痒及脑脊髓炎的症状。

- - 症状：潜伏期 3--6 天。病初神情淡漠，以后不安、拒食，常有呕吐。开始舐擦皮肤受伤处，随后搔抓、舐痒处。以后产生大范围的烂斑，周围组织肿胀。有的病例可见撕咬各种物体，咽麻痹、不能吞咽，口流涎。瞳孔大小不等，反射降低。头、颈及唇肌有时抽搐。部分病例还可见类似狂犬病的症状。呼吸困难。常很快死亡。

- - 预防：消灭犬舍中的老鼠和禁喂病猪肉，对预防该病具有重要意义。无特效疗法，只有免疫血清及疫苗有效。犬舍消毒用 0.1%火碱水。伪狂犬病对人有一定危害，患者皮肤剧痒，通常不会引起死亡。一般经皮肤创伤感染，因此处理病犬及其尸体时要注意自我保护。

6.4、结核病

犬结核病是由人型或牛型结核杆菌引起的慢性传染病。主要是由于狗狗舐食结核病人的痰或吸入含细菌的空气而感染，也可以因接触患开放性结核的病牛、病猫而感染。反之，病狗也可传染给人。感染主要通过呼吸道和消化道途径，以室内豢养和缺乏锻炼的老狗多发。

- - 细菌在外界环境中生存力较强，但加热 60℃，30 分钟可被杀死，10%的漂白粉很有效。链霉素、卡那霉素、异烟肼和对氨基水杨酸可抑制细菌生长，用于治疗。

- - 症状：由于该病是慢性病，故病狗在相当一段时间内不表现症状，以后出现食欲不振、容易疲劳、虚弱、进行性消瘦，精神不振等。肺结核表现咳嗽（干咳），后期转为湿咳，并有粘液脓性的痰。消化道结核表现消化功能紊乱顽固性下痢、消瘦、贫血，常有腹水。皮肤结核多发生于颈部，有边缘不整齐溃疡，溃疡底为肉芽组织。

- - 诊断：可疑病狗，可通过结核菌素眼睑皮内变态反应试验确定。眼睑皮内试验是于睑缘下 1

厘米处，0.1ml 皮内注射，36 小时观察有无局部肿胀及全身反应。

- - 防治：扑杀病狗，或用链霉素、卡那霉素治疗，施行彻底隔离、消毒。

6.5、犬窝咳

什么是犬窝咳，犬窝咳顾名思义，一个犬咳嗽就会导致全窝犬都咳嗽，是多种病毒引起的呼吸道烈性传染病，犬窝咳是俗称。

一、犬窝咳病毒：

- 1、副流感病毒：打喷嚏咳嗽、发热、听诊气管和肺区有粗厉的呼吸音，病情严重时出现呼吸性心律不齐，致死率非常高的一种呼吸道传染病。
- 2、腺病毒 II 型：发热、咳嗽、呼吸困难、继续发展成肺炎。
- 3、疱疹病毒：主要感染 2 周龄以内的哺乳仔犬，大于 35 日龄的主要表现为流鼻涕干咳，如发生混合感染则引起致死性肺炎。

二、常规疗法：

- 1、抗病毒：病毒唑、鱼腥草、穿琥宁、胸腺肽、转移因子等等。
- 2、止咳、化痰：用药物溴己新、糜蛋白酶、氨茶碱、进行超声雾化吸入。
- 3、防感染：丁氨卡那霉素、头孢曲松、红霉素等等。
- 4、黄芪多糖等等。

6.6、犬瘟热

犬瘟热是当前对犬威胁最大的高度接触性传染病，具有比较突出的一系列临床症状，以病初呈现双相性体温升高、眼鼻有浆液性或脓性分泌物、出现呼吸道和胃肠道感染以及中、后期发生肌肉抽搐或瘫痪为特征。

本病致死率极高，感染幼犬的死亡率高达 80%以上。

一、病原及流行病学

病原为犬瘟热病毒，主要通过呼吸道和消化道传染，也有眼结膜、口腔黏膜和鼻腔黏膜等感染途径。传染源主要是患犬和带毒犬，许多犬场因购入带毒犬引起本病流行。患犬和带毒犬可通过泪液、鼻液、唾液、尿液及呼出的气体排出病毒，从而造成食物、饮水、用具及周围空气等的污染。据有关资料，感染犬经尿排毒可达 60--90 天。

易感动物主要是犬科、鼬科和浣熊科动物，各种年龄、性别和品种的犬均可感染，但以 1 岁之内 3--12 个月的幼犬最易感，往往成窝发病，其发生本病的年龄与断奶后母源抗体的消失有关。病愈犬可获得坚强免疫力，持续数年以至终生。

二、症状

犬瘟热的临床症状一般比较突出而典型，主要表现在以下几个方面：

1、双相性体温升高：半病潜伏期 3--6 天。多数患犬于感染后第 4 天、少数于第 5 天体温升高达 39.8--41 摄氏度，持续 1--2 天，接着有 2--3 天的缓解期（体温趋于 38.9--39.2 摄氏度）。随着体温再度升高，出现呼吸系统和消化系统明显感染症状，甚至神经系统感染，病程长达数周。

2、呼吸系统症状：是本病的主要症状。病初随着体温升高，患犬精神轻度沉郁，食欲不振，流泪，有水样鼻液，时有咳嗽。病情发展不久，眼、鼻分泌物转为黏膜性或脓性，喉气管及肺部听诊呼吸音粗厉。在疾病中、后期，往往发展为支气管肺炎，患犬鼻端干燥（裂），有多量脓性鼻液。患犬大多表现本病特有的化脓性结膜炎外观：即脓性眼屎附着于内、外眼角与上、下眼睑，眼角和眼睑周边脱毛、光秃，似戴一副眼镜状。

3、消化系统病状：本病初、中期常有呕吐表现，但次数不多，食欲减退或废绝，对本病具有一定的示病意义。幼犬通常排出深咖啡色混有黏液或血液的稀便，而成犬一般数日无便。患犬因呕吐、腹泻以及食欲废绝，逐渐脱水、衰竭。

4、神经系统症状：神经症状多在发病中、后期（3--4 周），少数于病初出现，对本病具有重要的示病意义。轻者口唇、眼睑、耳根抽动，重者踏脚、转圈或翻滚、运动失调、后肢麻痹，特别是咬肌或侧卧时反复有节律的抽搐，是本病的特征表现。

5、皮肤、足垫症状：在发病初期或末期，部分患犬四肢足垫角质化过度、变硬，幼年患犬常在腹下和股内侧皮薄处出现米粒或豆粒大小的红斑、水疱或脓疱。使用抗生素治疗后，腹下和股内侧的脓性皮炎很快干枯消失。康复犬硬化的足垫角质层逐渐脱去。

三、诊断

当患犬出现本病典型病状后，不难作出诊断。然而在发病初期，须与普通感冒进行鉴别。根据临床观察，犬瘟热患犬病初双眼一般多因流泪，而呈所谓“泪汪汪”现象，或上下眼睑黏附多量黏脓性分泌物，而普通感冒一般没有这种现象。

目前许多宠物诊所回医院使用进口犬瘟热快速诊断试纸，取患犬眼、鼻分泌物、唾液或尿液等为检测样品，可在 5--10 分钟内作出诊断。尤其对病初症状不典型的病例，有比较重要的诊断作用

四、预后

在病初患犬尚未出现典型症状时，尽快注射犬瘟热单克隆抗体或抗犬瘟热高免血清，可使免疫状态增强到足以阻止疾病发展。若特征性临床症状，尤其是神经症状出现，则预后不良，患犬即使经耐心治疗后幸存，往往遗留四肢抽搐或意识不清的后遗症。

五、治疗

病初尽快注射犬瘟热单克隆抗体或犬瘟热高免血清，剂量一般应大于每千克体重 1--2 毫升，连用 2--3 天。为抑制病毒增生和控制细菌继发感染，常应用病毒唑、双黄连、清开灵、氨苄青霉素、头孢菌素 V 或头孢曲松等。

对发热患犬，应用安痛定或复方氨基比林，并配合应用氢化可的松或地塞米松。有便血症状的，可应用安络血或止血敏。呕吐不多或已经控制的，可投服抗病毒口服液与庆大霉素等。

实践证明，早期输液和配合应用犬干扰素、细胞因子等免疫增强剂，能有效防止机体脱水，提高抗病力，促进患犬康复。

六、预防

目前国产犬三联、五联或七联疫苗，均可用来预防犬瘟热等常见多种疾病。推荐的免疫程序为：幼犬于 7--9 周龄时开始接种，然后以 2--3 周的间隔连续接种 2--3 次，以后每年加强免疫 1--2 次。进口疫苗较多使用荷兰英特威国际有限公司犬系列疫苗，对 7 周龄犬首免的血清应答率可达 90%，对 9 周龄以上犬免疫的血清学应答率可达 100%，预防保护性确实。

鉴于当前幼犬发病率很高，推荐犬于 4--6 周龄时注射小犬二联苗，8--9 周龄时注射犬五联和犬钩体苗，12 周龄时重复注射，并同时注射狂犬苗。以后每年加强免疫一次。

6.7、犬细小病毒病

感染犬细小病毒感染 1978 年由美国首先发现，我国也有发生。本病只见于犬，幼犬特别易感。自然感染主要通过直接和间接接触。病犬的粪、尿、呕吐物和唾液中都含有病毒。病毒污染食物、垫料和环境等造成传染。发病率 20%--100%，致死率 10%--50%，4 周龄以内死亡率最高。康复犬的粪尿中可长期带毒，以及隐性感染的犬带毒，都是危险的传染源。

— 病原：犬细小病毒病是犬细小病毒引起的犬的一种急性传染病。以出血性肠炎或非化脓性心肌炎为其主要特征。多发生于幼犬。

— 症状：本病的症状有两型，即肠炎型和心肌炎型。肠炎型潜伏期约 7~14 天。一般先呕吐后腹泻，粪便先黄色或灰黄色，有多量粘液和伪膜，而后粪便呈蕃茄汁样，带有血液，发出特殊难闻的腥臭味。病犬精神差，没有食欲，体温升至 40℃ 以上(也有体温不升高的)，并迅速脱水。也有的呈间歇性腹泻或排软便。心肌炎型病犬脉快而弱，呼吸困难，可视粘膜苍白。听诊心脏可听到杂音。

— 细小病毒的治疗：治疗细小病毒以输液、肌注、灌肠给药为止，根据病情变化而变化用药，禁水禁食，禁止口服给药，否则呕吐更剧烈，精神更差，对康复极为不利。网上有介绍白乌汤、妈咪爱等等口服药物治愈细小病毒的说法，也许只是个案，也许所治愈的并不是细小病毒，所以采取口服给药的这种治疗方法不可取，因为细小病毒病最难控制是呕吐，加重呕吐等于加速死亡。

注意：细小病毒痊愈的犬在一年半时间内具有极强抵抗细小病毒的能力，极个别终生免疫，细小病毒痊愈后的犬也极易感染犬瘟，为了安全起见，细小病毒痊愈后要抓紧免疫。

6.8、蛔虫病

犬蛔虫病是由犬蛔虫和狮蛔虫引起的疾病。犬蛔虫主要致 1-2 个月的幼犬，狮蛔虫则寄生于 6 月龄以上的狗。这两种蛔虫都是通过病狗的粪便排出虫卵，在温、湿度适当的情况下，经 3-5 天发育成侵袭性虫卵。

犬吞食了被这种虫卵污染的饲料、饮水，在肠内孵出幼虫。前者，幼虫进入肠壁随血流入肺，再沿支气管、气管上行至喉头被咽下，最后在小肠内发育成成虫；狮蛔虫幼虫只是钻至肠壁内发育，再回到小肠内成熟。虫卵对外界抵抗力很强。

- - 症状：病狗出现消瘦、粘膜苍白、食欲减退、呕吐，发育迟缓。蛔虫大量寄生可引起肠梗阻或阻塞胆道。由于蛔虫毒素的作用还可引起癫痫样神经症状。

- - 诊断：根据临床症状，再取粪便作饱和食盐水漂浮法检查虫卵即可确定。

- - 治疗：用盐酸左旋米唑，每公斤体重 10 毫克口服，效果很好。

6.9、钩虫病

钩虫病是犬重要的线虫病之一，我国西北及南方多见。钩虫寄生于小肠（特别是十二指肠和空肠），虫体长 1-2 厘米。由于虫体前端弯曲，且口缘有三个锐利的钩状齿，可深深地“钉”在粘膜上吸血；虫体的分泌物能使血不凝，引起不断出血，病狗由于不断多量失血，造成严重贫血。

钩虫卵在外界温度（28-32℃）湿度合适的情况下发育，一周后达到侵袭期，生活于水及潮湿的泥土中。幼虫主要经皮肤（也可经口）侵入宿主体内，随血行到心、肺，经呼吸道、喉头再转到消化道寄生。妊娠犬，可经胎盘进入胎儿体内。幼虫在宿主体内 3 周就发育成成虫。

- - 症状：病狗拉稀带血和粘液，贫血、消瘦食欲不振，有时出现浮肿，出现生长发育障碍，有时见皮痒。

- - 治疗：同蛔虫病。

6.10、犬恶丝虫

病犬恶丝虫较常见，是寄生于右心室中的丝虫，也称心丝虫，长 25 厘米，呈白线状。雌成虫与雄虫在心室内交配后产生胚胎性微丝蚴。蚴随血流至皮下，当蚊虫或蚤叮咬吸血时进入昆虫体内发育，最后到达唾液腺和口器中。当蚊、蚤再叮咬其它犬时，微丝蚴逸出，钻入皮下、肌间、脂肪组织内发育长大，再经静脉移行进入右心室，待 8-9 个月成熟。

- - 症状：成虫在右心室内随血流滚动，机械地引起心功能紊乱或发生心内膜炎；微丝蚴可阻塞肾、脑、肺等血管。一般情况下（成虫少于 25 个）无明显症状，严重时可有慢性咳嗽、易疲劳、呼吸困难、干咳；右心衰竭，肝、脾肿大，腹水、浮肿；血尿；皮肤（特别是耳廓部）有小结节

(内含微丝蚴) 或溃疡。

- - 诊断: 一毫升血加 7% 醋酸液或加 1% 盐酸溶液 5 毫升, 离心 2-3 分钟, 取沉淀物镜检, 找到微丝蚴即可诊断。

- - 治疗: 肺波芬 0.5-5 毫升, 每日肌注或静脉注射, 直至血检蚴虫消失为止。约 1/3 有中毒症状。海群生 60-70 毫升/公斤体重或配 30% 的溶液一次肌注或皮下注射, 连用 3-5 周。硫磺酰胺钠 2.2 毫克/公斤体重, 一日二次, 缓慢静注, 连用两天。盐酸二氯苯胂 2.5 毫克/公斤体重, 以蒸馏水稀释成 1% 溶液缓慢静注, 隔 4-5 天一次。

6.11、食管丝虫病

食管丝虫是寄生于食管或胸主动脉壁的寄生虫。成虫红色卷曲如螺旋形, 长 6-8 厘米 (雌虫)。虫卵随粪便排出被粪甲虫吞食, 在其体内发育成侵袭幼虫; 蛙、鸡、鸭、刺猬等吃甲虫; 犬吃甲虫或上述各种动物而被感染。幼虫钻入胃、肠壁中, 经由门脉、肝、后腔静脉、肺、心, 最后到达食道寄生, 引起肉芽肿 (线虫结节)。

- - 症状: 一般不明显。有的病例可出现食欲减退、呕吐、吞咽困难等症状。

- - 诊断: 检查粪便中的虫卵确定。

- - 治疗: 海群生 10 毫克/公斤体重, 或用六氯对二甲苯 (血防 846) 100-150 毫克/公斤体重, 连用 7-10 天。

6.12、旋毛虫病

由于旋毛虫广泛地寄生于人、犬、猪、猫、鼠等多种动物体内, 而狗又有吃动物尸体或粪便的习性, 牧区养狗有很多机会感染。

旋毛虫寄生于横纹肌中, 特别是活动量大的膈肌、肋间肌等处。成虫在肠内雌雄交配, 所产幼虫经肠系膜淋巴管入胸导管至右心, 再经肺转入体循环, 随血流至全身 (此时是感染后第 12-30 天)。只有到肌肉中的幼虫才能发育、成长, 周围有一包裹, 虫体卷曲其中。包裹幼虫在肌肉中可生活数年至 25 年。犬吃了含有包裹幼虫的动物尸体, 包裹在胃内被溶解, 释放出来的幼虫在十二指肠和空肠内变为成虫。

- - 症状: 一般不明显。感染严重时可出现肌肉疼痛、吞咽、咀嚼和行走困难等。

- - 防治: 关键是要注意感染环节, 了解人和动物之间接触和食肉感染的危害。

6.13、绦虫病

狗绦虫病也是常见的寄生虫病，其危害在于绦虫蚴可感染人和各种家畜，危害生命，造成经济损失。

狗的绦虫有很多种，生活史都是绦虫的成熟孕卵节片随粪便排出体外，为中间宿主食入（不同种的绦虫有不同的中间宿主群，如犬多头绦虫，中间宿主是牛、羊、马、骆驼和人，在脑、脊髓内形成多头蚴，危害人畜生命）。在各中间宿主体内的各个脏器中形成囊尾蚴；最终，犬又吃了含有囊尾蚴的各种动物肉尸及内脏，囊尾蚴在小肠内发育、成熟成各种绦虫。

- - 症状：犬感染绦虫后一般不明显，只是从犬排出的粪便中见到乳白色的绦虫节片。大量感染时可出现腹部不适、贫血、消瘦、消化不良等。

- - 防治：用氢溴酸槟榔素，用量为 1.5~2 毫克/千克体重，口服。使病犬绝食 12~20 小时后给药。为了防止呕吐，应在服药前 15—20 分钟 给予稀碘酊液(水 10 毫升，碘酊两滴)。或用吡喹酮，用量为 5~10 毫克/千克体重·次，口服。或用盐酸丁萘脒，用量为 25—50 毫克/千克体重，1 次口服，驱除细粒棘球绦虫用 50 毫克，间隔 48 小时再用 1 次。

6.14、球虫病

球虫病是侵害幼犬的寄生虫病。当环境卫生条件不好和饲养密度较大时，可使疾病严重流行。球虫生于小肠粘膜上皮细胞内，经几代无性繁殖（即裂体生殖）后，变成有性生殖，形成大小孢子。二者结合后形成卵囊，随粪排出体外。卵囊在合适的温度条件下，发育成感染卵囊（即含有子孢子的卵囊）。幼狗吞吃了被感染卵囊污染的食物和饮水即可感染。无性繁殖产生的大量繁殖体、裂殖子破坏肠上皮，构成危害，出现症状，甚至死亡。

- - 症状：腹泻，混有粘液、带血；进行性消瘦，发育停滞，最后衰竭死亡。

- - 治疗：呋喃类或磺胺类药物均有效。

6.15、犬利什曼原虫

病犬可互相传染。利什曼原虫寄生于巨噬细胞和内皮细胞的胞质内，在组织抹片中也可见于细胞外。自然感染是由吸血昆虫—白蛉叮咬吸血时，原虫进入犬体内。

- - 症状：主要见贫血、消瘦和衰弱。有的病犬脾肿大和腹水，淋巴结肿大，后肢虚弱、呼吸困难。皮肤感染时，鼻镜、口角和眼睑可出现溃疡；慢性病例，往往出现皮肤湿疹和大面积的被毛脱落。

- - 诊断：主要依靠作血涂片或从皮肤溃疡缘刮取组织作涂片检查虫体。

- - 治疗：用新睇芬、葡萄糖酸睇钠治疗，但可复发。一般采取扑杀的办法，结合环境消毒灭白蛉。

6.16、疥螨病

疥螨病是由疥螨（一种外寄生虫）引起的犬常见的皮肤病。疥螨是一种节肢动物，它钻进宿主表皮挖掘隧道，虫体在其中生长繁殖。隧道有小孔，藉以通氧和为幼虫出入；幼虫也钻入皮肤、开掘小穴。其发育过程包括卵、幼虫、若虫和成虫四个阶段，整个过程为8--22天。

— 症状：疥螨病主要发生于头部（鼻梁、眼眶、耳廓基底部），有时也见于胸、腹下、四肢内侧、尾根等处。皮肤发红起皱褶，散在疹样小结，表面有黄痂。病犬搔抓、啃咬和磨擦患部致秃毛。该病易传染给人。耳螨侵害外耳道，引起剧痒、抓耳、摇头等症。尤其长毛、大耳的犬易发。诊断：根据症状，找到虫体（用小刀深刮病变皮肤，将刮取物放在玻片上，滴加10%氢氧化钠，放放大镜检查）。另要注意和湿疹，虱、蠕形螨寄生引起的皮肤病相鉴别。

— 治疗：隔离病犬，患部用0.5%敌百虫或滴滴涕乳剂，按1:9的比例与煤油混合涂擦（患部应先剪毛、用温肥皂水清除污垢），隔5--7天重复治疗1--2次。注意不要使狗舐食杀虫药。保持环境清洁卫生，作好检疫是预防的关键。

6.17、蠕形螨病

蠕形螨病也是犬常见的一种皮肤病，多发于5--6月龄的幼犬。蠕形螨因体细长，很象蠕虫而得名。它寄生于皮肤的毛囊和皮脂腺内，从产卵到卵发育成幼虫乃至成虫均在其中。该病是由健康犬与病狗接触而传染。健康小狗身上常有这种螨存在，当机体抵抗力降低（各种原因引起）或皮肤有发炎或经常洗澡皮肤被浸软时，即可侵入并大量繁殖引起疾病。

— 症状：该病主要发生于头部的眼眶周围、颈、唇、鼻部以及肘、脚爪等处。先是毛稀疏，继之脱落形成圆形秃斑；皮肤渐红，有麸皮状皮屑，皮肤粗厚、龟裂。以后，皮肤变蓝灰至紫铜色，不痒。有继发感染时，则在红、肿没毛的皮肤上出现绿豆至豌豆大的结节或脓疮。挤压时，有微红色脓液或粘稠的皮脂溢出。病变处覆有灰或灰棕色痂皮及麸皮样鳞屑，甚至皮肤形成溃疡，有黄红色分泌物。

— 诊断：取皮肤结节或脓疮内容物检查即可确定。从症状上看，很易于毛癣、湿疹、疥螨病混淆。

— 治疗：患部剪毛，用酒精和乙醚等混合液擦洗，然后用0.5%敌百虫液、0.2%敌敌畏液或石硫合剂（生石灰160克、硫磺240克加水3600毫升熟煮而成）涂擦。每隔2--5天用药一次。仅有脱毛屑者，用酒精或碘酒每天涂擦一次。

6.18、虱

危害狗的主要是血虱和啮毛虱。血虱长1--5毫米，头窄，体呈圆锥形，以吸食血为主；啮毛虱以食毛和皮屑为主，长0.5--10毫米，头比胸宽大。吸血寄生引起痒感，不安，有时皮肤出现小出血点，小结节，甚至化脓，幼犬发育不良。啮毛虱寄生出现脱毛，轻度痒。患虱病时，病变部易见

虱及黄白色虱卵。

- - 治疗：鱼藤粉或以 0.5--1%敌百虫水溶液喷洒或药浴。预防要加强管理，常梳刷犬身；打扫环境，消毒犬舍。

6.19、硬蜱

硬蜱是吸血的节肢动物，寄生于犬的体表，机械地损伤皮肤，造成痛痒、不安，病犬啃咬磨擦。雌蜱吸血，一次约 0.4 毫升。多量寄生会引起贫血。重要的问题是蜱可传染疾病或作为中间宿主使犬患某些寄生虫病。多数硬蜱在动物体表交配。交配后雌蜱吸饱血落地，爬到地缝隙或土块下蛰伏不动，4--8 天产卵。卵经一个月左右孵出幼虫。幼虫又爬到犬身上吸血；吸饱后又落地，蜕化变若虫。若虫再吸血、落地经十余天成熟。成虫吸饱血后，身体变圆，紫黑色，胀大几十倍、上百倍。

- - 防治：用手捕捉杀灭。犬舍缝隙喷洒一些有机磷杀虫剂，引进动物要检查。

6.20、犬疥螨的治疗

犬疥螨病，俗名“癞皮狗”，是由犬疥螨引起的传染性寄生虫病。多发于秋末、冬季和春季。特别是在犬舍潮湿、大体卫生不良，皮肤表面温度较高的条件下极易发生。如治疗不良，病犬经过“漫长”的冬季日渐消瘦，机体抵抗力显著下降，春季气温回升，雨量渐多，疥螨的繁殖，生长加快，致使病犬常在春夏死亡，春分过后昼长夜短，日照时数增多，是治疗疥螨病的关键时期。

- - 犬疥螨病主要发生于头部。有时也可能起始于前胸，腹下，腋窝、大腿内侧和尾根，然后蔓延至全身。病初，皮肤上出现红斑，接着产生疹状小结，表面有大量黄色的麸皮样脱屑；进而皮肤增厚，特别是面、颈和胸部的皮肤常形成皱褶；被毛脱落，表面覆有痂皮，除皮时皮肤呈鲜红且湿润，往往伴有出血。患部奇痒，当气温上升或运动后引起体温升高时更为剧烈；病犬终日啃咬、搔抓和磨擦患部，烦躁不安，逐渐消瘦，重则导致死亡。

- - 鉴别诊断：犬皮肤真菌病（俗称钱癣，秃头癣），犬虱病都有剧痒、脱毛等症状，但一般皮肤不会增厚。犬蠕形螨病（俗称毛囊虫病）则没有瘙痒，或痒觉很轻微，多数形成脓疮和湿疹并且没有传染性。

- - 消毒清洁：保持犬舍、犬身的清洁干燥。犬舍要求通风透气，地势高爽，阳光充足，并勤打扫，保持干净整洁，犬的全身要定期清洗，尤其是长毛品种的犬，夏天要 1 日 1 洗，冬季至少每星期洗一次，其他季节因时制宜。气温较低时，洗后要用干毛巾将毛擦干，并用电吹风彻底吹干。坚持每天梳刷毛皮，保证犬的皮肤卫生洁净。发现病犬，尽早隔离治疗，并对所有用具进行处理和消毒，避免健康犬与之接触，一切都要注意消毒，防止人为传播。消毒时用 10%~20%石灰乳或 2%氢氧化钠等，效果很好。

- - 进行药物治疗：0.5%敌百虫液，患部涂擦，5—7 天重复一次；0.1%-0.2%杀虫脒（3%啶虫脒微乳剂）患部涂擦或喷洒；10%硫（磺）软膏，涂擦患病处，每天 2 次，5—7 天为一疗程；苯

甲酸苜脂，每天或每隔 3 天涂擦一次患处。

- - 中药治疗本病效果较好。药方是陈石灰 1 份，百草霜、蛇床子各 2 份，硫磺 3 份，生茶油适量。上述药物共研磨混匀，用生茶油调制涂擦于犬患处，每日 1 次，连续 35 天，可痊愈。

- - 在治疗虫螨的整个过程中，每次涂擦杀螨剂不能超过犬身的 1/3，并且涂药后需要给犬戴上口罩，严防杀螨药的中毒。病犬剧痒不止时，可肌肉注射地塞米松等以止痒。全身感染时须结合局部用药应用广谱抗菌素。

6.21、犬膀胱炎

- - 病因：（1）感染了病原微生物。如大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌、变形菌等。（2）邻近器官炎症的蔓延。如肾炎、输尿管炎、前列腺炎、尿道炎，特别是母犬的阴道炎、子宫内膜炎时，炎症很易蔓延至膀胱，引起膀胱炎。（3）机械性损伤。如导尿管损伤、膀胱结石等都可刺激粘膜发生炎症。

- - 治疗：（1）改善管理，适当休息，喂以无刺激性、富于营养和易消化的饲料。应适当限制高蛋白饲料。（2）用消毒或收敛药冲洗膀胱。先用导尿管排出膀胱内的积尿，用微温盐水反复冲洗后，再用药液冲洗。为了消毒，可用 0.05% 高锰酸钾溶液、0.02% 呋喃西林溶液、0.1% 雷佛奴耳液。为了收敛，可用 1-3% 硼酸溶液、0.5% 鞣酸溶液、1-2% 明矾溶液等。严重的膀胱炎在冲洗膀胱后，灌注青霉素 80 万-120 万单位（溶于 50-100 毫升蒸馏水）于膀胱中，并全身应用青、链霉素或其他抗生素。（3）可适当应用尿路消毒剂。（4）注意防止微生物的侵袭和感染。实施导尿术时，应遵守消毒、无菌要求。对其他泌尿器官的疾病应及时治疗，以防蔓延。

6.22、犬睾丸炎

- - 睾丸炎是睾丸实质的炎症，常与附睾同时发病。

- - 症状：急性睾丸炎，睾丸肿大，发硬，有热痛；同时体温升高，精神差，食欲不振。慢性睾丸炎，睾丸硬，热痛不明显。

- - 治疗：急性睾丸炎的初期，可采用醋酸铅、明矾液冷敷。症状缓和后，可用温敷，也可局部涂鱼石脂软膏，同时肌注或内服抗菌素。

- - 慢性睾丸炎可涂樟脑软膏，若治疗无效，应将睾丸摘除。化脓性睾丸炎应手术切开排脓或将睾丸摘除，并应治疗原发病。

6.23、卵巢囊肿

- - 卵巢中未破裂的卵泡或黄体成分变性和萎缩，形成空腔称为囊肿。前者称为卵泡囊肿，后者称为黄体囊肿。

- - 症状: 卵泡囊肿时母犬表现性欲亢进, 持续发情, 阴门红肿, 偶尔有血样分泌物; 急躁, 凶恶, 甚至攻击主人, 经常爬跨其他犬, 却拒绝接受交配。黄体囊肿时, 母犬不发情。

- - 治疗: 根治需要手术摘除卵巢。

6.24、犬子宫内膜炎

子宫内膜炎, 是狗狗子宫粘膜及粘膜下层的炎症。

- - 病因: 通常是在发情期、配种、分娩、难产助产时, 由于链球菌、葡萄球菌或大肠杆菌等的侵入而引起感染。子宫粘膜的损伤和机体抵抗力下降, 是该病发生的重要诱因。

- - 症状: 急性子宫内膜炎母犬体温升高, 精神差, 食欲下降, 渴欲增强, 有时呕吐和腹泻; 有时出现拱腰及排尿姿势。从生殖道排出灰白色混浊, 含有絮状物的分泌物或脓性分泌物, 特别是在卧下时排出较多; 触诊腹壁可触诊到子宫角增大, 病犬有疼痛表现, 子宫角感觉如面团样, 有时有波动。

- - 治疗: 子宫内膜炎的治疗原则是抗菌消炎, 促进子宫排出内容物和子宫机能的恢复。

1)、如果子宫颈可开张, 可以冲洗子宫, 不开张的可肌肉注射垂体后叶激素 2-10 单位, 促使子宫颈口开张和子宫收缩, 然后用温生理盐水或 0.02% 呋喃西林溶液冲洗, 每天冲洗 1 次, 连续 2~4 次。冲洗之后向子宫内注入青霉素 20 万和链霉素 500mg, 或注入新霉素 100mg;

2)、全身症状明显时应肌肉注射抗菌素;

3)、最好能输液;

4)、如上述疗法无效时, 需手术切除卵巢和子宫。

6.25、犬子宫蓄脓

- - 病因: 子宫内蓄积大量脓性渗出物不能排出时, 称为子宫蓄脓。

- - 症状: 精神沉郁, 食欲不振, 烦渴, 呕吐, 多尿, 呼吸快, 体温有时升高。腹部膨大, 触诊疼痛; 有时伴发顽固性腹泻。阴门肿大, 排出一种难闻的脓汁, 在尾根及外阴部周围有脓附着。如果不及时治疗, 可能造成脓毒败血症。

- - 治疗: 肌肉注射己烯雌酚 0.2-0.4mg, 促使子宫颈口开张, 3 天后注射垂体后叶素 2-4 单位, 可以促进子宫收缩, 排出积脓, 同时内服或肌注抗生素。根据病情适当补液。

6.26、流产

- - 流产病因：引起流产的原因很多，大致有以下几种：各种机械性损伤。如腹部受到碰撞、冲击、创伤及腹部手术等，极易造成流产。多种传染病。如患布鲁氏菌病的母犬往往在外表上看不出异常，但在妊娠的 45~55 天即发生流产，犬瘟热、结核病、传染性肝炎等也使流产的发生率增高。寄生虫病。母犬患有弓形虫病时，也常可引起流产。

- - 诊断要点：临床诊断一般比较容易，如发现妊娠母犬不足月即发生腹部异常，排出活的或死的胎儿即可确诊。要注意的是大部分病例并不一定能看到流产的过程及排出的胎儿，而只是看到阴道流出分泌物。在妊娠早期发生的隐性流产，由于胚胎已被子宫吸收，阴道也无异常改变。

遇有这些情况就要对母犬做全面的检查，先看看营养状况如何，有无其他疾病，然后仔细地触诊腹壁，以确定子宫内是否还存有胎儿。有时母犬所怀胎儿只有一个或几个流产，剩余胎儿仍可能继续生长到怀孕足月时娩出，称之为部分流产。

对流产的病因诊断非常重要，只有弄清病因，才能确定病犬能否继续配种和采用何种治疗方法。如患有布鲁氏菌病的母犬，就不能再配种怀孕，即使妊娠了，最终还要流产。

病因诊断比较复杂，需要做多项实验室检查，如血清学试验、激素测定、尿液分析、阴道分泌物的微生物培养等。有条件者，还要对流产胎儿做各项检查。因此，母犬流产后，犬主应将产出的胎儿一并送兽医检验单位检查。

- - 防治措施：对母犬出现流产征兆时，要采取保胎措施。可给病犬肌肉注射黄体酮，其剂量为 2~5 毫克/次，连用 3~5 天，并进行对症治疗。如病犬体质虚弱，要及时输液、补糖。体温升高，血象呈炎症变化时，要注射抗生素。对胎儿排出困难、胎衣不下或子宫出血等症状，应注射催产素等催产药物(用量为 2~10 单位/次)。对胎儿已腐败的病例，除注射抗生素外，还应用 0.1% 高锰酸钾液冲洗生殖道。

为防止流产，配种前应检查母犬有无布鲁氏菌病等传染性疾病。妊娠期间应加强饲养管理。对有流产病史的母犬，可在妊娠期间注射黄体酮，预防流产。

6.27、产后搐搦症

产后搐搦症是一种以低血钙为特征的代谢性疾病。表现为肌肉强直性痉挛，意识障碍。本病在产前、分娩过程中及分娩后均可发生，但以产后 2~4 周期间发病最多，且多见于泌乳量高的母犬。

- - 病因：缺钙是导致发病的主要原因。胎儿骨骼的形成和发育需要从母体摄取大量的钙，产后随乳汁也要排出部分钙。如果母犬得不到钙的及时补充，体内就会缺钙，缺钙引起神经肌肉的兴奋性增高，最终导致肌肉的强直性收缩。

- - 诊断要点：一般是突然发病，没有先兆。病初呈现精神兴奋症状，病犬表现不安，胆怯，偶尔发出哀叫声，步样笨拙。呼吸急促。不久出现抽搐症状，肌肉发生间歇性或强直性痉挛，四肢僵直，步态摇摆不定，甚至卧地不起。体温升高(40 度以上)，呼吸困难。脉搏加快，口吐白沫，

可视粘膜呈蓝紫色。从出现症状到发生痉挛，短的约 15 分钟，长的约 12 小时，过程较急。如不及时救治，多于 1~2 天后窒息死亡。快速诊断十分重要，结合临床症状，检测血钙含量，如血钙低于 0.67 毫摩/升（6 毫克/100 毫升）即可确诊。

- - 防治措施：静脉注射 10% 葡萄糖酸钙 5~20 毫升（须缓慢注入），同时静脉注射戊巴比妥钠（剂量为 2~4 毫克/千克体重）或盐酸氯丙嗪（剂量 1.1~6.6 毫克/千克体重·次·肌内注射）控制痉挛。母犬口服钙片或在食物中添加钙剂。

为预防产后搐搦症，在分娩前后，食物中应提供足量钙、维生素 D 和无机盐等。泌乳期间要注意口粮的平衡和调剂。

6.28、不育症

一、母犬不育症

1 岁半以上或以往能正常发情交配的母犬，在较长时间内（10~24 个月）不见发情；或发情不正常且屡配不孕的，均可认为是不育症。

1、不育原因，有先天性的（如两性畸形、生殖器官发育不全等），有饲养管理不当的（如饲料单一，缺乏某种必需氨基酸、无机盐、维生素等），母犬过肥过瘦、年老衰弱，感染某些疾病（如布鲁氏菌病、结核病、卵巢囊肿、子宫内膜炎）等。

2、主要表现不发情，或发情却屡配不孕，甚至公犬无法与其交配。

3、防治方法：可试用孕马血清、绒毛膜促性腺激素及雌激素进行治疗。用量：孕马血清（精制品每支含 400 单位、1000 单位、3000 单位）犬为 25~200 单位/次，皮下或肌内注射，1 日或隔日 1 次。绒毛膜促性腺激素的用量为 25~300 单位，肌内注射。己烯雌酚为 0.2~0.5 毫克/次。此外，应改善饲养管理条件。如仍不能交配受精，则不应作种用。

二、公犬不育症

是指公犬在交配不能射精，或排出的精液中无精子、死精、精子畸形，或活力低等不能使卵子受精。

1、发生原因很多，如饲料质量不好，缺乏维生素（主要是维生素 A 和维生素 E），运动不足，配种过度或长期不配种，公犬年老体衰，生殖器官疾病（隐睾、睾丸萎缩、睾丸及附睾炎等）或感染某些疾病，如布鲁氏菌病、结核病、内分泌紊乱（雄激素不足等）。

2、主要表现公犬无性欲，见发情母犬阴茎也不能勃起（阳症），或勃起后也不射精。检查精液品质不良。

3、治疗方法：应改善饲养管理条件，给以足够的营养物质，以增强体质。要加强体力锻炼，配种要适度，防止过多或过少。对生殖道的疾病要给以适当治疗。对性欲缺乏的公犬，可内服甲基辜

丸素（甲基睾丸酮）10 毫克或肌内注射丙酸睾丸素（丙酸睾丸酮）20~50 毫克/次。对治疗无效或年老体衰的公犬，应淘汰不作种用。

6.29、犬胃肠溃疡

- - 常见的胃肠溃疡有炎症性和消化性溃疡。

- - 症状：出现顽固性呕吐、吐血、便血和腹痛。病犬精神差，体质虚弱，被毛粗乱、无光泽，逐渐消瘦。

- - 治疗：①不要喂给粗硬或刺激性大的食物，可喂一些牛奶、鸡蛋和肉末等；②抗酸，可选用氢氧化铝凝胶 5ml，每天 3 次；复方胃舒平每次 2 片，每天 3 次；③胃蛋白酶抑制剂，硫糖铝（胃溃宁），每次 0.5g，每天 3 次；④促进溃疡愈合，生胃酮 50mg，每天 3 次，3~5 周为一疗程；⑤并发症的处理，对于胃出血，可内服鞣酸或肌肉注射维生素 K。胃穿孔时，应进行紧急手术。

6.30、犬胃扩张

- - 胃扩张是由于犬的胃分泌物、食物或气体积聚过多使胃发生扩张所引起的疾病。

- - 病因：原发性胃扩张多是由于采食过量干燥的难以消化或容易发酵的食物，马上剧烈运动或饮用大量冷水而引起。继发性胃扩张主要继发于胃扭转、幽门阻塞及小肠狭窄、便秘、梗阻等。

- - 症状：病犬腹痛，嚎叫不安，可见暖气、流涎和呕吐。常继发肠鼓气，左侧肋骨下方隆起。呼吸浅而快。

- - 治疗：①积气性胃扩张可通过插入胃管排气，或用粗针头经腹壁进行胃穿刺放气。②催吐，皮下注射阿朴吗啡 0.04mg/kg 体重，以排出胃内容物，可缓解症状。③镇痛皮下注射度冷丁 5~10mg/kg 体重。④如果是胃扭转需手术治疗。

犬胃扩张见于断奶小狗喂饲过量食物，或者狗吃了不易消化或容易发酵的饲料，如喂玉米片、麦片后没大量饮水等情况下。胃内异物（如石料、金属球、木塞、线绳果核、布片等）及幽门狭窄、肠便秘、梗阻时，由于食物较长时间停留而继发慢性胃扩张。

- - 症状：表情淡漠、不安、呻吟、暖气、呼吸渐快、腹胀。严重时可窒息。慢性胃扩张时，在肋后可摸到胀满的胃；空腹时，叩诊呈鼓音，食后呈浊音，消化不良等。

- - 治疗：用胃管导胃，或皮下注射阿朴吗啡（0.001 - 0.005 克）或碳酸胆碱（0.001 克/25 公斤）催吐。胃内异物如不能排除，应手术取出。

6.31、口炎

口炎是口腔（包括舌、牙龈）粘膜的炎症。

- - 病因：异物（如鱼刺、骨头等）、过冷过热的食物，化学物质（如舐食腐蚀性药物等），老狗齿石及各种病原微生物（如病毒、坏死杆菌），传染病如犬瘟热等均可引起。

- - 症状：由于口腔疼痛而拒食，或小心咀嚼；硬物常从口中吐出，大量流涎，口腔粘膜潮红，温高，口臭，舌苔重。水泡性口腔炎时，口腔粘膜有水泡，其中充满浆液；水泡破裂出现鲜红的糜烂面或溃疡。患溃疡性口炎时，门齿和犬齿齿龈部暗红色出血、肿胀、组织坏死脱落形成溃疡，牙齿松动；与病相对应的唇、颊部也发生溃疡。口恶臭，咀嚼困难。

- - 治疗：用 0.1%高锰酸钾液、2%氯酸钾溶液或 2%明矾液冲洗口腔。溃疡面以碘甘油或 1%磺胺甘油混悬液涂擦。慢性口炎用 1%--5%的蛋白银，中药冰硼散效果也很好。

6.32、扁桃腺炎

犬扁桃腺炎，主要由于狗狗吃雪、喝冰水及突然的气温变化以及细菌感染引起，如链球菌、巴氏杆菌、A 型魏氏梭菌等。有人认为：扁桃体的病灶可引起肾炎、关节炎，故当患其它的慢性复发性疾病时，应注意检查扁桃体。

- - 症状：急性扁桃腺炎多发生于 1--3 岁的狗，表现发烧（41℃）、厌食，常见打哈欠，轻压喉部引起咳嗽。口腔检查见扁桃腺红肿，有泡沫样粘液，甚至溃疡。

- - 治疗：用磺胺或抗生素治疗局部涂以碘甘油（碘 1 份，碘化钾 3 份和甘油 30 份）。

6.33、胃扭转

胃扭转不多见，主要发生于大型狗，似乎有家族性或遗传性。较老年的挽用犬，由于长年饱食后奔跑，往往有胃韧带的松弛或断裂。当犬剧烈滚动、旋转、上下跳，遇有胃半充满，较沉重，或充盈液体内容时，则将以食道胃连接处为轴心，胃的幽门部从右侧转向左侧构成 180° 大转弯。

- - 症状：突发腹痛，表情淡漠，呆立或倒卧，行动僵硬、不食。腹部迅速膨胀；推动胃下部，可听到溅水声；呼吸困难，多于 1-2 天内死亡。

- - 治疗：手术整复。

6.34、肛门腺

肛门腺囊肿在犬的肛门内、两侧内外括约肌之间有两个肛门周围腺，藉导管向外排分泌物；由于局部损伤、细菌感染或长期拉稀粪等原因，易造成腺体导管阻塞，使腺体分泌物滞留、发炎，多发生于老犬。

- - 症状：肛门腺肿胀、痛、痒感。患犬啃咬会阴、肛门处或抵物磨蹭，致尾根脱毛。
- - 治疗：治疗原发病，用戴指套的食指伸入肛门检查肛门腺，并按压挤出积留物；或向囊肿内注射 1-2 毫升植物油，软化滞留物使之自动排出。必要时手术切除。

6.35、肝硬化

肝硬化，是指肝组织损伤后由大量的结缔组织增生，使器官变硬。该病是慢性过程，常发生于较年老的狗。

- - 原因及发生：慢性中毒，肝炎，营养不良都会造成不同程度的肝组织损坏，并代之以结缔组织增生；肝蛭由于寄生在胆管中引起慢性胆管炎，致胆管周围结缔组织增生，从而发生肝硬化。
- - 症状：食欲不振，易疲乏；恶心、呕吐、消化不良或有腹泻。严重肝硬化时，有腹水，出血素质，肝、脾肿大，低蛋白血症，门脉高压等现象。临床上通过肝功检查（转氨酶升高）而定。
- - 治疗：去除致病原因，对症治疗。静注 40% 葡萄糖 5-10 毫升以增加肝组织的糖元储存。甲硫胺酸、半胱胺酸等氨基酸有嗜脂功能，可保护肝。给予大剂量的复合维生素 B 和维生素 C。应用类糖皮质激素也有效。

6.36、肠炎

- - 病因：通常是由饲养不当而引起的，比如过冷的食物，腐败变质、难消化的饲料，高度的神经紧张或者是有毒的药物（外用药被舐食），以及大量的应用抗生素，破坏肠道菌系等；某些传染病（例如细小病毒感染、犬瘟热、钩端螺旋体等）、寄生虫病（例如蛔虫、绦虫、钩虫）以及真菌、细菌以及其毒素，甚至食量过敏等都可能引起肠炎。按照肠炎的性质以及严重程度分为卡他型肠炎、坏死性肠炎、纤维素性肠炎、出血性肠炎等。
- - 症状：除了食欲减退、精神不好、甚至废绝之外，最为重要的症状就是腹泻、腹痛、肠音亢进、拱背、里急后重等，肛门的周围沾污粪便。根据于病变的性质，拉稀可以呈水样、或者是糊状、粘液带血，粪便有恶臭。有细菌或是病毒感染的时候，可能会有体温升高。急性肠炎的时候往往有胃炎并发，故出现呕吐以及腹泻。病犬严重的脱水，精神沉郁，眼球下陷并且无神，皮肤失去了弹性，脉细、弱、快，血浓缩。单发肠炎会有严重腹泻的时候也会出现脱水的现象。粪便带血的时候，可以根据血色判定出来血部位，后段色鲜红，例如呈煤焦油样则表明是胃内出血。
- - 治疗：轻微的卡他型肠炎，是能够自愈。通常应当清理胃肠，使用中性盐类泻剂，加速胃肠腐败且发酵的内物排出，进而使用人工盐、复方龙胆酊等健胃。倘若水泻不止，可以使用收敛剂比如活性炭；为保护肠粘膜，可以使用氢氧化铝、次硝酸铋。止痛用阿托品或者是颠茄酊。例如属细菌或是病毒性肠炎，可以用磺胺药、呋喃类药或是抗生素，例如痢特灵、氯霉素、磺胺咪等。除此之外，根据病情使用补液，强心，给维生素 B、C 等。

6.37、肾炎

肾炎是狗的常见病，且往往性质严重。大多数病例是由血源性刺激引起。这包括毒素、微生物（如犬瘟热、病毒性肝炎、钩端螺旋体等）和由肠内容发酵产生的吲哚、粪臭素等有毒的代谢产物，大面积烧伤时产生的组织分解毒素。

此外，汞、砷制剂、松节油、木溜油酚、斑蝥、煤焦油等毒物的直接刺激均可引起，甚至是变态反应表现。犬肾炎从临床上可分为肾功能不足，急性和慢性肾炎及尿毒症几种。

(1) 肾衰竭时表现食欲丧失，口渴。肾衰竭见于肾功能不足时，限制了肾的供血量。由于尿不能浓缩，出现多尿，尿比重降低。反之，由于重吸收或滤出不足也可出现少尿，尿色暗，比重增加。严重病例完全无尿。

-- 治疗：以强心、限制盐，给富有营养的易消化食物为宜。可饮些糖水或茶水。静注 40% 葡萄糖以调节排尿，用洋地黄增加心输出。肾区用微波、透热和热敷以增加肾的血供应。

(2) 急性肾炎时表现精神萎靡、食欲减退、消化不良呕吐、肠炎、肾区疼痛、弓背、行走僵硬，排尿次数增多且很痛苦。早期少尿，尿色暗或粉红、混浊比重高。尿中有大量蛋白（超过 20%），尿沉渣中细胞成份增多（注意：蛋白尿不是肾炎的特征，它还见于持续发烧、过度用力和神经病时，而严重的肾损伤却可能不含蛋白），有血尿。尿沉渣中见蛋白管型、颗粒管型、红细胞管型或上皮管型及细菌等。水肿可出现可不出现。

-- 治疗：静注大量维生素 C（500 毫克）和葡萄糖酸钙（2-5 毫升）。尿里有细菌时可用 6 甲基-4 铵。它可使尿成酸性并在酸性尿中形成甲醛而起作用。应注意 6 甲基-4 铵一定不能与磺胺合用，因为可以在肾内形成结晶。此外，也可用广谱抗生素。

(3) 慢性肾炎疾病牵涉到肾实质和间质，经过隐闭，在发现之前已存在相当时间。最常见的症状是剧渴并伴有多尿（无色、比重低、水样）。这是间质性肾炎的代偿性功能增强的表现，以促进多喝水，稀释尿（蛋白含量 1% 或测不出）。由于氯的逐渐丧失，所以组织的保水能力低，因而出现脱水现象。临床出现步态僵硬、弓背，结膜苍白、皮毛无光，局部脱毛并见慢性湿疹。发展病例出现酸毒血症，表现深呼吸，心音第二声强，脉实而紧张。X 光揭示心肥大（特别是左心室）。透明管型是慢性间质性肾炎的特征。

-- 治疗：同急性肾炎。考虑到氯的丧失和脱水，应静注 10% 氯化钠 3-8 毫升。

(4) 尿毒症尿毒症是肾病的晚期表现。神情疲惫，呆滞，皮肤无弹性，消瘦，极渴（甚至喝泥坑里的水和自己的尿）。由于肾脏不能排除机体的代谢产物而发生中毒，呼吸和皮肤、粘膜散发出尿味。口腔和舌上有溃疡。溃疡糜烂的表面附灰绿色的渗出物。尿毒症的另一症状是持续呕吐。酸中毒时，呼吸慢而深，晚期肌肉痉挛或抽搐，最后昏迷死亡。

-- 治疗：同肾病。口腔用鼠尾草茶冲洗，溃疡涂碘甘油，用碳酸钠调整酸毒血症，用炭末吸收肠内的分解产物等对症疗法。

6.38、膀胱炎

膀胱炎主要是由三种原因引起。一种是血源性感染，一种是上行性感染（如用不洁的导尿管治疗，使病原因素——大肠杆菌、变形杆菌随器械进入），三是由创伤引起（如结石、刺激或直接损伤），四是由于尿的潴留、分解，形成氨和有害物质刺激粘膜引起。分为急性和慢性两种。

- - 症状：急性膀胱炎时，尿频和尿少（几滴），但每天的尿总量仍在正常范围，排尿时疼痛。尿有氨味，颜色发暗、发粘，含有絮片，成碱性或中性反应。尿中有蛋白，沉渣中含磷酸盐结晶和上皮，大部份病例细菌检查阳性，公狗阴茎勃起。慢性膀胱炎时，基本症状同上，只是病程拖的很长。

- - 治疗：休息，热敷膀胱保暖，用补液和利尿剂或向膀胱内注入温硼酸高锰酸钾液（0.25：30：1000 水），每次 30 - 50 毫升冲洗以增加膀胱内细菌的排出。使用广谱抗生素和全身对症治疗。乌洛托品 0.2 - 0.5 克制成 10% 溶液，每天 2 - 3 次。

6.39、尿石症

犬常见膀胱内结石。结石往往以细胞和管型为核心，并不断有钙盐沉积其上形成。这种情况发生于尿中钙盐浓度过高时，由于保护性胶体的作用使钙盐沉积。

狗结石的形成与营养方案有一定的关系（因为营养低时不常见结石），结石是由磷酸盐或尿酸盐组成。

- - 症状：基本上与膀胱炎所见者相同，有里急后重感。费了极大的力气，但只排小量的血尿，X 光检查可确诊。

- - 治疗：只有手术去除，注意防止复发。如果结石是磷酸盐组成的，则应尽可能地保持尿成酸性，多吃些鱼、肉、蛋等食物，少吃牛奶、水果和蔬菜；尿酸盐结石病例，应多摄入水，包括牛奶。公狗尿道结石常见于尿道的阴茎段。症状是病犬总有紧急排尿感，但只排出几滴血样的尿。如果结石阻塞不完全，则尿流细。膀胱扩张，腹部能摸到一圆形的硬肿。用导尿管试探，至结石部不通；X 光检查可确诊。

- - 治疗：尿道切开去石，尿道注射玻尿酸酶，通过降低表面张力使结石分解排出。

九、结语：

亲爱的朋友，通过这 6 万多字的各种狗狗疾病的介绍，您是否对如何保护自己的狗狗，有了更多的了解呢？

如果你有更多的问题，或者想了解更多的狗狗的疾病知识，请在新浪微博上搜索“@[狗狗知识大全](#)”或者访问 www.weipet.cn（“我们爱宠物网”），这里有一系列的相关文章和资料。欢迎大家每天来学习了解，更欢迎大家与我交流，一起探讨各种狗狗的问题，交流养狗的心得。

另外，我们在淘宝上有更多的狗狗的训练、疾病、喂养、护理等宠物电子书籍。如果您感兴趣，可以浏览相关店铺。<http://shop57017295.taobao.com>。

我非常愿意帮助大家，把自己的狗狗们养得更健康，更安心！同时，因为本博主才疏学浅，此文中难免有所不妥之处。如果有各位专家或者达人发现问题，欢迎来信指正，不胜感激。最后，再次感谢您的浏览！

附录：（本书参考文献与资料）

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1、《你也可以当宠物犬医生》 | 福建科学技术出版社 |
| 2、《犬病防治百科》 | 吉林科学出版社 |
| 3、《爱犬急症与护理》 | 河南科学技术出版社 |
| 4、《狗狗医学百科》 | 辽宁科学技术出版社 |
| 5、《狗狗成长日志 驯养与疾病防治》 | 气象出版社 |
| 6、《狗 宠物家庭医生》 | 北京体育大学出版社 |
| 7、《初次养狗万用百科》 | 汗湘文化事业股份公司（台湾） |